



แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

The Medical Association of Thailand

หน้าหลัก

คณะกรรมการ

ประวัติสมาคม

กิจกรรม

สมัครสมาชิก

จพสก. ออนไลน์

ติดต่อ

นายกสมาคม ฯ


จพสก. ออนไลน์



พล.ต.ท.จงดรณ์ อวจนพงษ์

คุยกับนายก

กฎระเบียบนำรู้



จพสก. ออนไลน์

คลิกดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม
Potential Conflicts
of Interest FormChecklists and Guidelines
for Authors of
the Submitted
Manuscripts and
Peer Reviewersสิ่งทีควรทราบสำหรับ
ผู้ส่งบทความมา
ให้พิจารณาตีพิมพ์แนวการเขียน
บทความ จพสก.ประกาศคำตีพิมพ์
บทความ

จดหมายข่าว



จดหมายข่าว มิถุนายน 2554

more

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Attitudes and Sexual Function in Thai Pregnant Women

265

Attapol Kerdarunsuksri MD*, Sumonmal Manusirivithaya MD**

* Department of Obstetrics and Gynecology, Ratchaphiphat Hospital, Bangkok, Thailand

** Department of Obstetrics and Gynecology, Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira, Bangkok, Thailand

Abstract

Objective: To evaluate the attitudes towards sexuality and sexual function in Thai pregnant women.

Material and Method: A cross-sectional study was conducted among 347 healthy pregnant women, aged 14-42 years, who attended the antenatal clinic, Ratchaphiphat Hospital. The Female Sexual Function Index (FSFI) questionnaire was used for sexual function assessment.

Results: The mean age of the pregnant women was 26.3 years. The mean gestational age was 25.7 weeks and 52, 146 and 149 pregnant women were in their first, second and third trimester respectively. Half of the pregnant women believed that having sex during pregnancy is a natural and normal part and about 70% were not concerned about decreasing sexual desire throughout pregnancy. Only 11.2% of pregnant women displayed a positive attitudes that sexuality during pregnancy made them happy and 47% were concerned that sexual intercourse during pregnancy may be harmful to the fetus. Nineteen percent of pregnant women had had no sexual intercourse in the past four weeks. The mean total FSFI score was 15.49, 93.4% had FSFI score of < 26.5, which was defined as potential sexual dysfunction. Comparing the mean FSFI score of every domain including total score, the pregnant women reported a significant decrease in all domains between the first and third trimester.

Conclusion: Potential sexual dysfunction in Thai pregnant women was rather high. Sexuality was decreased significantly throughout pregnancy. However, most of the pregnant women were not concerned about decreasing sexual desire during pregnancy.

Keyword : Sexual function, FSFI, Pregnancy, Thai women

[Download Full Paper](#)

Vol93_No.3_265_5781.pdf [77.41 Kb]



แพทยสภา



ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ



ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

> ดูเว็บไซต์ทั้งหมด

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้นที่ 4 ซ.ศูนย์วิจัย ก.เพชรบุรีตัดใหม่
เขตบางกอก-ปี เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0 - 2314- 4333 ,0 - 2318-8170 โทรสาร : 0 - 2314-8305
E-mail : math@loxinfo.co.th, info@mat.or.th, webmaster@mat.or.th

Powered by
WorldMedic

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2009