

ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน ในอุทยานแห่งชาติภูเรือ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Species diversity of butterflies in Phu Ruea National Park, Phu Ruea district, Loei province

กิตติ ตันเมืองปัก,¹ ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์,¹ พิสุทธิ์ เอกอัมวย²

Kitti Tanmuangpak,^{1*} Sirikorn Sritho,¹ Pisuth Ek-Amnuay²

Received: 20 February 2017 ; Accepted: 3 August 2017

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความหลากหลาย การกระจายตัว และความชุกชุมสัมพัทธ์ของผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย ระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 โดยการไลบ์จับผีเสื้อกลางวันและบันทึกข้อมูลในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Line Transect) 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 สวนหินสารารค (1,341-1,350 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และเส้นทางที่ 2 น้ำตกห้วยไฝ (910-919 เมตรจากระดับน้ำทะเล) เส้นทางละ 3 กิโลเมตร ผลการสำรวจพบผีเสื้อกลางวัน 726 ตัวอย่าง 5 วงศ์ 91 สกุล 161 ชนิด เส้นทางสวนหินสารารค พบทั้งหมด 350 ตัวอย่าง 5 วงศ์ 67 สกุล 111 ชนิด และเส้นทางน้ำตกห้วยไฝ พบทั้งหมด 376 ตัวอย่าง 5 วงศ์ 60 สกุล 100 ชนิด เมื่อวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Weiner's index; H') ค่าการกระจายตัว (E_H) และความชุกชุมสัมพัทธ์ พบร่วมกันในสวนหินสารารค มีค่าความหลากหลาย และค่าการกระจายตัว เท่ากับ 4.221 และ 0.896 ตามลำดับ โดย *Ypthima baldus baldus* (Fabricius, 1775) มีความชุกชุมสัมพัทธ์มากที่สุด เส้นทางน้ำตกห้วยไฝมีค่าความหลากหลาย และค่าการกระจายตัว เท่ากับ 3.951 และ 0.858 ตามลำดับ โดย *Eurema hecabe hecabe* (Linnaeus, 1758), *Eurema simulatrix sarinoides* (Fruhstorfer, 1910), *Junonia lemonias lemonias* (Linnaeus, 1758) และ *Ypthima savara savara* (Grose-smith, 1887) มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์มากที่สุด ชนิดของผีเสื้อกลางวันทั้งสองเส้นทางมีความคล้ายคลึงกันปานกลาง ($Ss = 0.47$) สรุปได้ว่าผีเสื้อกลางวันในอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีความหลากหลายสูงและเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้

คำสำคัญ: ความหลากหลาย ผีเสื้อกลางวัน อุทยานแห่งชาติภูเรือ

Abstract

The aims of this research were comparative studies in species diversity and abundance of butterfly communities, which were assessed at different elevations in mixed-deciduous forest of Phu Ruea National Park, Loei Province from March 2013 to January 2014. Butterflies were collected by sweeping along line transects (3 km long) at two different elevations. The two transects were (1) the Suanhin Sra Sawan natural trail (1,341-1,350 m above sea level) and (2) the Huayphai Waterfall natural trail (910-919 m above sea level). A total of 726 individuals representing 161 species in 91 genera belonging to five families were recorded. Of these, 350 individuals, 111 species in 67 genera belonging to five families were found at Suanhin Sra Sawan natural trail and 100 species in 60 genera belonging to five families, totaling 376 individuals at Huayphai Waterfall natural trail. Differences in species diversity and abundance of butterflies between the transects were analyzed. The Shannon-Weiner's index of diversity (H') and Evenness index (E_H) were highest at high elevation and lowest at low elevation. *Ypthima baldus baldus* (Fabricius, 1775) had the highest

¹ สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

² สวนสัตว์แมลงสยาม ตำบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

¹ Majority of Biology, Department of Science, Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University

² Siam Insect Zoo, Mae Ram, Mae Rim, Chiang Mai, 50180

* Corresponding author; Kitti Tanmuangpak, Majority of Biology, Department of Science, Faculty of Science and Technology, Loei Rajabhat University, Mueang District, Loei Province 42000, Thailand. Landsnail2015@hotmail.com

abundance at high elevation while at lower sites, *Eurema hecabe hecabe* (Linnaeus, 1758), *Eurema simulatrix sarinoides* (Fruhstorfer, 1910), *Junonia lemonias lemonias* (Linnaeus, 1758) and *Ypthima savara savara* (Grose-smith, 1887) were most abundant. Butterfly species assemblages from high and low elevation transect were moderately similar ($S_s = 0.47$). Finally, the result suggested that high diversity of butterflies at Phu Ruea National Park, might reflect a high quality habitat, and butterflies could be selected as a good bioindicator of habitat.

Keywords: species richness, butterflies, Phu Ruea National Park

บทนำ

ปัจจุบันโลกตระหนักและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่งยืน โดยเฉพาะแมลงในกลุ่มผีเสื้อกลางวัน¹⁻⁴ ที่มีการศึกษาทั่วโลก ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของโลก (hot spot)⁵⁻⁸ และพบว่า สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น (endemic species)⁵⁻⁷ มีการศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ประเทศไทย⁹⁻¹¹ ประเทศไทย¹² ประเทศอินโดネเซีย¹³⁻¹⁶ ประเทศพิลิปปินส์¹⁷ และในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ในประเทศไทยมีการศึกษาความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันอย่างต่อเนื่อง โดย Ek-Amnuay (2012)¹⁸ พบความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันทั้งหมด 1,604 ชนิด และมีรายงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดเลย กิตติ และคณะ¹⁹ ศึกษาที่ป่าชุมชน อำเภอภูเรือ โดยงานวิจัยครั้งนี้ ทำการศึกษาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยังเป็นแหล่งดันน้ำที่สำคัญ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสภาพป่าที่มีความแตกต่างกันยอมทำให้มีอาหารและที่อยู่อาศัย ของแมลงมีความแตกต่างกัน แต่จากความงามตามธรรมชาติ และอากาศที่หนาวเย็นทำให้อุทยานแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทำให้มีปริมาณมนพิษและขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญต่อการบูรณาการถิ่นที่อยู่อาศัยและวิถีการดำรงชีวิต ส่งผลต่อการลดจำนวนของผีเสื้อกลางวัน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมีความสำคัญในการบ่งชี้ถึงความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน ในยุคที่การท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติภูเรือ

กำลังเพื่องฟุและรุ่งเรือง เพื่อจะเป็นการนำเสนอข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างดี ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาความหลากหลาย ความชุกชุมสัมพันธ์ ของผีเสื้อกลางวัน ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
- เพื่อศึกษาเบรียบเทียบสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง ของชนิดของผีเสื้อกลางวัน ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วิธีการวิจัย

การเก็บและรวบรวมตัวอย่าง

สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างผีเสื้อกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ (Figure 1) โดยทางเส้นทางสำรวจผีเสื้อกลางวัน (butterfly transect)²⁰ 2 แนว ตามระดับความสูง 2 ระดับ ระยะทาง 3 กิโลเมตร และกว้าง 10 เมตร โดยใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนหินสารสรรค์ ($17^{\circ}30'470''$, N และ $101^{\circ}19'596''$, E) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,341-1,350 เมตร และเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยไฝ ($17^{\circ}28'885''$, N และ $101^{\circ}21'108''$, E) ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 910-919 เมตร (Figure 2) สำรวจโดยใช้สวิงตัวจับผีเสื้อกลางวันในแนวสำรวจเส้นทางละ 1 วัน โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาได้แก่ เวลา 10.00 – 12.00 น. และเวลา 14.00-16.00 น. สำรวจสองเดือนต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557




Figure 1 Map of Phu Ruea National Park³²




Figure 2 Line transect trails for butterflies collection in Phu Ruea National Park, (1) Suanhin Sra Sawan natural trail and (2) Huayphai Waterfall natural trail.³³

การระบุชนิด

นำตัวอย่างผีเสื้อกลางวันที่รวมรวมได้มาทำการระบุชนิด โดยใช้คู่มือ Butterflies in Thailand (Ek-Amnuay, 2012)¹⁸ และนำไปเทียบตัวอย่างเพื่อระบุชนิดที่พิพิธภัณฑ์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ และที่ศูนย์กีฏวิทยา

ป่าไม้ที่ 2 ชุมแพ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีบี และพันธุ์พีช) จังหวัดขอนแก่น โดยตัวอย่างผีเสื้อกลางวันจะทำการเก็บตัวอย่างและนำออกนากพื้นที่เพื่อนำไประบุชนิด เก็บตัวอย่างชนิดละไม่เกิน 5 ตัว โดยการจับครั้งถัดไปหากพบเป็นผีเสื้อชนิดเดียวกันจะบันทึกภาพและข้อมูล จากนั้นจะปล่อยคืนสู่

ธรรมชาติในสภาพที่ผิดเสื่อมบูรรณ์ เมื่อระบุชนิดเสร็จแล้ว
เรียบง่ายจะนำมาจัดแสดงไว้ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ และเก็บ
ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ภูวิทยาป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็นตัวอย่างอ้างอิงต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล สูตรที่ใช้ในการคำนวณ

ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener
(Shannon-Wiener's index, H)²¹ ดังนี้

$$S = - \sum_{i=1}^n p_i (\ln p_i)$$

โดยที่ p_i = สัดส่วนระหว่างจำนวนตัวของผีเสื้อกลางวันชนิดที่ i ต่อจำนวนตัว ของผีเสื้อกลางวันทั้งหมด (เมื่อ $i = 1, 2, 3, \dots, s$)

$s = \text{จำนวนชนิดของผีเสื้อกลางวันทั้งหมดในเส้นทาง}$

\ln = ล็อกการิทึมฐานธรรมชาติ (natural logarithm)

ดัชนีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener's Evenness index, E_E)²¹

$$\text{ສ්ථර } E_H = H' / H_{\max} = H' / \ln S$$

โดยที่ $H' =$ ค่าความหลากรูปของ Shannon-Wiener

S = species richness (จำนวนชนิดของสิ่งมีชีวิต)

E_H มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 (ค่ามากที่สุดคือ 1 หมายความว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนเต็มทั้งหมด หรือ เรียกว่ามีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ)

สูตรการหาค่าความชักชุม (ร้อยละ)

$$\text{ความชุกชุม} = \frac{\text{จำนวนครั้งที่พบผีเสื้อกลางวันชนิดนั้น}}{\text{จำนวนครั้งที่สำรวจผีเสื้อกลางวันทั้งหมด}} \times 100$$

สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงของชนิดผีเสื้อกลางวันที่พบใน 2 เส้นทาง โดยใช้ Sorenson's Similarity Coefficient²¹

$$\text{ສຕຣ } Ss = 2a/2a+b+c$$

เมื่อ S_s คือค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง (Sorenson's Similarity Coefficient)

a คือ จำนวนชนิดที่พบในเส้นทางที่ 1 และ 2 (number of species in sample A and B)

b คือ จำนวนชนิดที่พบในสัมบัติที่ 1 แต่ไม่พบในสัมบัติที่ 2 (number of species in sample B but not in sample A)

c คือ จำนวนชนิดที่พบในสัมภาระที่ 2 แต่ไม่พบในสัมภาระที่ 1 (number of species in sample A but not in sample B)

ผลการวิจัย

การสำรวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในเขตรากที่ 1 และเส้นทางที่ 2 ทางศึกษาธรรมชาติสวนหินสะสรรค์ (เส้นทางที่ 1) และเส้นทางที่ 2 ทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยไผ่ (เส้นทางที่ 2) อุทยานแห่งชาติภูเรือ (Figure 4) พบรังษีเสื้อกลางวัน 5 วงศ์ 91 ตัว 161 ชนิด โดย วงศ์ผีเสื้อหางดิง (Family Papilionidae) พบรังษีเสื้อหางดิง 10 ชนิด วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหลា (Family Pieridae) พบรังษีเสื้อหางดิง 18 ชนิด วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Family Nymphalidae) พบรังษีเสื้อหางดิง 78 ชนิด วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน (Family Lycaenidae) พบรังษีเสื้อหางดิง 32 ชนิด 41 ชนิด และวงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Family Hesperiidae) พบรังษีเสื้อหางดิง 10 ตัว 14 ชนิด (Table 1,3) เส้นทางที่ 1 พบทั้งหมด 5 วงศ์ 67 ตัว 111 ชนิด แบ่งออกได้ดังนี้ วงศ์ผีเสื้อหางดิงพบรังษีเสื้อหางดิง 7 ชนิด วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหลาพบรังษีเสื้อหางดิง 7 ตัว 15 ชนิด วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่พบรังษีเสื้อหางดิง 28 ตัว 55 ชนิด วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงินพบรังษีเสื้อหางดิง 21 ตัว 27 ชนิด และวงศ์ผีเสื้อบินเร็วพบรังษีเสื้อหางดิง 7 ตัว 7 ชนิด ส่วนเส้นทางที่ 2 นั้น พบทั้งหมด 5 วงศ์ 60 ตัว 100 ชนิด แบ่งออกได้ดังนี้ วงศ์ผีเสื้อหางดิงพบรังษีเสื้อหางดิง 4 ตัว 9 ชนิด วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่พบรังษีเสื้อหางดิง 24 ตัว 49 ชนิด วงศ์ผีเสื้อสีน้ำเงินพบรังษีเสื้อหางดิง 21 ตัว 27 ชนิด และวงศ์ผีเสื้อบินเร็วพบรังษีเสื้อหางดิง 7 ตัว 10 ชนิด (Table 1,3)

ดัชนีความหลากชนิดในเส้นทางที่ 1 มีค่าดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 4.221 สูงกว่าเส้นทางที่ 2 ที่มีค่าเท่ากับ 3.951 และต่ำกว่าเส้นทางที่ 3 ที่มีค่าเท่ากับ 4.420 ซึ่งมีความหลากชนิดของผีเสื้อกลางวันสูง ดัชนีการกระจายตัวในเส้นทางที่ 1 พบร่วงดัชนีการกระจายตัวมีค่าเท่ากับ 0.896 ซึ่งถือเป็นกลางวันแต่ละชนิดนั้นมีการกระจายตัวสม่ำเสมอค่อนข้างสูงต่ำกว่าเส้นทางที่ 2 ค่าที่ได้นั้นค่อนข้างสูงเช่นกัน มีค่าเท่ากับ 0.858 และต่ำกว่าเส้นทางที่ 3 ที่มีค่าเท่ากับ 0.870 (Table 2)

เมื่อนำข้อมูลของทั้งสองเส้นทางตลอดทั้งปีมาวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง พบร่วมค่าเท่ากับ 0.47 กล่าวได้ว่าความคล้ายคลึงของผีเสื้อกลางวันทั้งสองเส้นทางนั้นมีความคล้ายคลึงกันปานกลาง และความซูกชุมของผีเสื้อกลางวัน เส้นทางที่ 1 ชนิดที่มีความซูกชุมมากที่สุด ได้แก่ *Ypthima baldus baldus* (Fabricius, 1775) (ผีเสื้อศีตลอจ)

ตาห้าธรรมดा) และ *Eurema hecate hecate* (Linnaeus, 1758) (ผีเสื้อเนรธรรมดा) มีค่า 83.33% รองลงมาได้แก่ *Eurema brigitta hainana* (Moore, 1878) (ผีเสื้อเนรจิว), *Neptis hylas kamarupa* (Linnaeus, 1758) (ผีเสื้อกะลาสีธรรมดា), *Junonia lemonias lemonias* (Linnaeus, 1758) (ผีเสื้อแพนซีสีดาล) และ *Parantica aglea melanoides* (Moore, 1883) (ผีเสื้อลายเสือขีดยาว) มีค่าเท่ากับ 66.67% (Figure 3) และเส้นทางที่ 2 ชนิดที่มีความชุกชุมมากที่สุดได้แก่ *Eurema hecate hecate* (Linnaeus, 1758) (ผีเสื้อเนรธรรมดा), *Eurema simulatrix sarinoides* (Fruhstorfer, 1910) (ผีเสื้อเนรภูเขา), *Junonia lemonias lemonias* (Linnaeus, 1758) (ผีเสื้อแพนซีสีดาล) และ *Ypthima savara savara*

(Grose-smith, 1887) (ผีเสื้อสีดาลจุดตาห้าสีจาง) มีค่าเท่ากับ 83.33% รองลงมาได้แก่ *Ypthima baldus baldus* (Fabricius, 1775) (ผีเสื้อสีดาลจุดตาห้าธรรมดा) (Figure 3), *Eurema blanda silhetana* (Wallace, 1867) (ผีเสื้อเนรสามจุด) และ *Mycalesis intermedia* (Moore, 1892) (ผีเสื้อตานพุ่มคั่นกลาง) มีค่าเท่ากับ 66.67% เมื่อวิเคราะห์ค่าความชุกชุมสัมพัทธ์รวมกันทั้งสองเส้นทางศึกษา พบว่า *Eurema hecate hecate* (Linnaeus, 1758) (ผีเสื้อเนรธรรมดा), *Eurema simulatrix sarinoides* (Fruhstorfer, 1910) (ผีเสื้อเนรภูเขา) และ *Parantica aglea melanoides* (Moore, 1883) (ผีเสื้อลายเสือขีดยาว) มีความชุกชุมมากที่สุดเท่ากับ 100%




Figure 3 Some butterfly species in Phu Ruea National Park collected between March 2013 and January 2014, (A) *Eurema hecate hecate* (B) *Eurema simulatrix sarinoides* (C) *Junonia lemonias lemonias* (D) . *Ypthima baldus baldus* (E) *Ypthima savara savara* and (F) *Cigaritis syama terana* (Bar 1 cm).



Figure 4 Site collections in Phu Ruea National Park, (A) Suanhin Sra Sawan natural trail and (2) Huayphai Waterfall natural trail.

Table 1 Number of genera and species of five families of butterflies in Phu Ruea National Park collected between March 2013 - January 2014.

Family	Number of genera and species of butterflies					
	Suanhin Sra Sawan		Huayphai Waterfall		Total	
	Genera	Species	Genera	Species	Genera	Species
Papilionidae	4	7	4	5	5	10
Pieridae	7	15	4	9	8	18
Nymphalidae	28	55	24	49	36	78
Lycaenidae	21	27	21	27	32	41
Hesperiidae	7	7	7	10	10	14
Total	67	111	60	100	91	161

Table 2 Diversity index (Shannon-Weiner's index) and Evenness index (E_H) of butterflies in Phu Ruea National Park in two line transect trails between March 2013 - January 2014.

Sites	Indices	
	Diversity index (H')	Evenness index (E_H)
Suanhin Sra Sawan	4.221	0.896
Huayphai Waterfall	3.951	0.858
Total	4.420	0.870

Table 3 Number of each butterfly species in Phu Ruea National Park collected between March 2013 - January 2014.

No.	Scientific name	Number of individuals of butterflies (natural trails)												Total of individuals		
		Mar		May		July		Sep		Nov		Jan				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Family Papilionidae																
1	<i>Atrophaneura varuna zaleucus</i>	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2	<i>Graphium agamemnon agamemnon</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
3	<i>Graphium sarpedon sarpedon</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
4	<i>Pachliopta aristolochiae goniopeltis</i>	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
5	<i>Papilio clytia clytia</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	<i>Papilio demoleus malayanus</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	<i>Papilio helenus helenus</i>	5	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	11	1	12
8	<i>Papilio memnon agenor</i> (f. <i>gynandromorph</i>)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
9	<i>Papilio polytes romulus</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	<i>Troides aeacus aeacus</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total		10	3	6	3	2	2	0	0	0	0	0	0	18	8	26
Family Pieridae																
11	<i>Appias albina darada</i>	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1	7
12	<i>Catopsilia pomona pomona</i> (f. <i>alcmeone</i>)	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
13	<i>Catopsilia pomona pomona</i> (f. <i>crocale</i>)	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
14	<i>Catopsilia pomona pomona</i> (f. <i>jugurtha</i>)	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
15	<i>Catopsilia pomona pomona</i> (f. <i>hilaria</i>)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	<i>Cepora nadina nadina</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17	<i>Delias descombesi descombesi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
18	<i>Delias pasithoe beata</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	<i>Eurema blanda silhetana</i>	0	1	0	6	0	0	0	3	0	7	0	0	0	17	17
20	<i>Eurema brigitta hainana</i>	1	0	0	0	5	0	9	0	0	0	1	0	16	0	16
21	<i>Eurema brigitta senna</i>	1	0	0	0	0	0	11	1	1	0	0	0	13	1	14
22	<i>Eurema hecate hecate</i>	1	0	1	1	2	10	0	4	1	9	1	2	6	26	32
23	<i>Eurema laeta pseudolaeta</i>	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2
24	<i>Eurema simulatrix sarinoides</i>	0	2	0	6	1	3	6	7	0	4	1	0	8	22	30
25	<i>Eurema simulatrix tecmessa</i>	2	5	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	9	11
26	<i>Leptosia nina nina</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
27	<i>Pieris rapae crucivora</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
28	<i>Prioneris thestylis thestylis</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total		8	8	32	14	8	14	27	17	2	24	3	2	80	79	159

Table 3 Number of each butterfly species in Phu Ruea National Park collected between March 2013 - January 2014.
(Continue)

No.	Scientific name	Number of individuals of butterflies (natural trails)												Total of individuals		
		Mar		May		July		Sep		Nov		Jan		Trails	Total	
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
Family Nymphalidae																
29	Ariadne merione tapestrina	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	Athyma cama cama	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31	Athyma larymna siamensis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
32	Athyma nefte asita	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2
33	Athyma opalina shan	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
34	Athyma perius perius	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
35	Athyma selenophora bahura	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
36	Cethosia biblis biblis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	4
37	Cethosia biblis perakana	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	0	4
38	Cirorrhoea tyche mithila	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
39	Cupha erymanthis erymanthis	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	7
40	Cynitia lepidae sthavara	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
41	Dichorragia nesimachus nesimachus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42	Enispe duranius corbeti	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2
43	Euploea core godartii	1	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11
44	Euploea mulciber mulciber	0	6	5	4	0	0	0	0	0	0	1	5	6	15	21
45	Euploea orontobates	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46	Euripus nyctelius nyctelius	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
47	Euthalia alpheda verena	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
48	Faunis eumeus incerta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
49	Hestina nama nama	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50	Hypolimnas bolina jacintha	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
51	Ideopsis vulgaris contigua	0	0	1	2	0	0	0	0	1	4	0	0	2	6	8
52	Ideopsis vulgaris macrina	0	1	0	0	1	0	0	0	1	4	0	0	2	5	7
53	Junonia almana almana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
54	Junonia iphita iphita	0	1	0	0	1	0	2	3	0	0	0	0	3	4	7
55	Junonia lemonias lemonias	0	0	0	1	2	5	1	5	3	6	2	1	8	18	26
56	Kallima inachus siamensis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
57	Laringa harsfieldi glaucescens	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
58	Lethe confusa apara	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	4	1	5
59	Lethe eropa niladana	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2
60	Lethe makara crijnana	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2

Table 3 Number of each butterfly species in Phu Ruea National Park collected between March 2013 - January 2014.
(Continue)

No.	Scientific name	Number of individuals of butterflies (natural trails)												Total of individuals		
		Mar		May		July		Sep		Nov		Jan				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Trails	Total	
61	<i>Lethe guinhal peguana</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62	<i>Lethe rohria rohria</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
63	<i>Lexias pardalis dirteana</i>	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
64	<i>Lexias pardalis jadeitina</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
65	<i>Melanitis leda leda</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3
66	<i>Melanitis zitenius auletes</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
67	<i>Mycalesis adamsoni</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
68	<i>Mycalesis anaxioides</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
69	<i>Mycalesis anaxias aemate</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
70	<i>Mycalesis distanti</i>	0	0	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	1	9	10
71	<i>Mycalesis francisca sanatana</i>	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
72	<i>Mycalesis gotama charaka</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
73	<i>Mycalesis intermedia</i>	0	1	0	0	0	2	0	3	1	1	0	0	0	1	7
74	<i>Mycalesis maianeas maianeas</i>	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
75	<i>Mycalesis perseoides</i>	0	0	0	0	0	1	5	0	1	2	1	0	7	3	10
76	<i>Neptis clinia leuconata</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
77	<i>Neptis hylas kamarupa</i>	6	2	2	0	0	0	1	0	0	0	2	5	11	7	18
78	<i>Neptis hylas papaja</i>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
79	<i>Neptis sappho astola</i>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
80	<i>Neptis yerburii pandoces</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
81	<i>Neptis zaida putoia</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
82	<i>Parasarpa dudu dudu</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
83	<i>Pantoporia hordonia hordonia</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	3
84	<i>Parantica aglea melanoides</i>	2	4	1	0	1	0	1	0	0	2	0	1	5	7	12
85	<i>Parantica melaneus plataniston</i>	0	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	5	1	6
86	<i>Parantica sita ethologa</i>	0	0	2	0	3	2	1	0	0	0	0	0	6	2	8
87	<i>Parthenos sylvia apicalis</i>	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
88	<i>Penthema darlisa melama</i>	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2
89	<i>Phaedyma columella martabana</i>	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4	4
90	<i>Phalanta alcippe alcippoides</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91	<i>Phalanta phalanta phalanta</i>	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
92	<i>Polyura athamas samatha</i>	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
93	<i>Tanaecia julii odilina</i>	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
94	<i>Thaumantis diores diores</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1

Table 3 Number of each butterfly species in Phu Ruea National Park collected between March 2013 - January 2014.
(Continue)

No.	Scientific name	Number of individuals of butterflies (natural trails)												Total of individuals		
		Mar		May		July		Sep		Nov		Jan				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Trails	Total	
95	Tirumala septentrionis septentrionis	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	6
96	Vindula dejone erotella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
97	Vindura erota erota	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3
98	Ypthima baldus baldus	5	2	4	1	2	6	8	0	12	14	0	0	31	23	54
99	Ypthima baldus newboldi	0	0	0	0	0	0	0	28	0	2	0	0	0	30	30
100	Ypthima horsfieldii humei	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	3	5	8
101	Ypthima huebneri	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
102	Ypthima lisandra bara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
103	Ypthima pandocus corticaria	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5
104	Ypthima savara savara	0	4	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	2	2	10
105	Ypthima similis similis	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4
106	Ypthima singorensis indosinica	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3
	Total	27	37	42	22	30	32	31	58	24	47	19	21	173	217	390
	Family Lycaenidae															
107	Abisara abnormis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
108	Abisara geza niya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
109	Acytolepis puspa lambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
110	Arhopala eumolpus eumolpus	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
111	Bothrinia chennelli celastroides	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1	12
112	Catochrysops strabo strabo	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	3
113	Celatoxia marginata marginata	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
114	Celastrina lavendularis limbata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
115	Cheritra freja evansi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
116	Cigaritis syama terana	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
117	Discolampa ethion thalimar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
118	Euchrysops cneus cneus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
119	Everes hueselii dipora	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
120	Flos fulgida singhapura	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
121	Heliophorus ila nolus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2
122	Hypolycaena amasa maximianus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2
123	Iraota timoleon timoleon	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
124	Jamides abdul abdul	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
125	Jamides alecto ageladas	1	4	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	5	10
126	Jamides bochus bochus	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	11

Table 3 Number of each butterfly species in Phu Ruea National Park collected between March 2013 - January 2014.
(Continue)

No.	Scientific name	Number of individuals of butterflies (natural trails)												Total of individuals		
		Mar		May		July		Sep		Nov		Jan				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Trails	Total	
127	Jamides celeno aelianus	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0	1	6	2	8
128	Jamides celeno celeno	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	9
129	Jamides pura pura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	3
130	Lampides boeticus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
131	Leptotes plinius	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	5
132	Logania regina sriwa	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
133	Loxura atymnus continentalis	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2
134	Miletus mallus mallus	0	0	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	10	0	10
135	Nacaduba angusta albida	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	2
136	Nacaduba kurava euplea	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
137	Nacaduba subperusia lysa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
138	Pithecopa corvus corvus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
139	Simiskina phalia potina	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
140	Spalgis epius epius	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
141	Surendra vivarna amisena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
142	Udara placidula howarthi	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
143	Zemeros flegya sallica	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2
144	Zizeeria maha maha	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	6	9
145	Zizina otis lampo	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	4
146	Zizina otis sangra	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3
147	Zizula hylax hylax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total		27	32	10	6	10	4	14	0	5	9	3	9	69	60	129
Family Hesperiidae																
148	Aeromachus pygmaeus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
149	Celaenorhinus ladana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
150	Celaenorhinus munda maculicornis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2
151	Hasora taminatus bhavara	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2
152	Isma protoclea bicolor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
153	Lambrix salsala salsala	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
154	Notocrypta curvifascia curvifascia	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
155	Notocrypta paralysos asawa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
156	Potanthus nesta nesta	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3
157	Psolos fuligo subfasciatus	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	3
158	Tagiades japerus atticus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1

**Table 3 Number of each butterfly species in Phu Ruea National Park collected between March 2013 - January 2014.
(Continue)**

No.	Scientific name	Number of individuals of butterflies (natural trails)												Total of individuals		
		Mar		May		July		Sep		Nov		Jan				
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Trails	Total	
159	<i>Tagiades japetus ravi</i>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
160	<i>Tagiades ultra</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
161	<i>Udaspes folus</i>	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2
Total		2	1	0	0	4	3	3	1	1	6	0	1	10	12	22

วิจารณ์และสรุปผล

จากการสำรวจพื้นที่เสือกลางวันทั้งหมด 161 ชนิด 726 ตัว ซึ่งวงศ์พื้นที่เสือขาน้ำพุพบจำนวนประชากรมากที่สุด 390 ตัว ทั้งหมด 78 ชนิด รองลงมาวงศ์พื้นที่เสือหนอน kabu ทั้งหมด 159 ตัว 18 ชนิด วงศ์พื้นที่เสือสีน้ำเงินพบทั้งหมด 129 ตัว 41 ชนิด วงศ์พื้นที่เสือหางติ่งพบทั้งหมด 26 ตัว 10 ชนิด และวงศ์พื้นที่เสือบินเร็วพบทั้งหมด 22 ตัว 14 ชนิด โดยวงศ์พื้นที่เสือขาน้ำพุพบจำนวนประชากรมากที่สุด เมื่อเทียบกับวงศ์อื่นๆ เนื่องจากสภาพป่าที่ไม่รกรากและมีพืชอาหารตามเส้นทางสำรวจที่อาจจะมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผีเสือในวงศ์นี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละเส้นทางพบข้อมูลได้ดังนี้

เส้นทางศึกษาธรรมชาติสวนหินสารคุณพื้นที่เสือกลางวัน 350 ตัว ทั้งหมด 111 ชนิด วงศ์พื้นที่เสือขาน้ำพุพบจำนวนประชากรมากที่สุด เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของผีเสือกลางวัน เป็นป่าเบญจพรรณ สลับกับป่าสนและป่าดิบเข้าต่ำ ทำให้มีพืชพรรณกระจายอยู่เป็นจำนวนมากเป็นผลทำให้มีความหลากหลายของพืชอาหารและแหล่งหลบภัยจากศัตรู จึงทำให้พบพื้นที่เสือกลางวันในเส้นทางนี้ได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพป่าไม่รกรากและมีหญ้าและพืชวงศ์ตัวเจริญอยู่ข้างเส้นทางสำรวจจึงเป็นอาหารสำหรับตัวเต็มวัยได้เป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาความหลากหลายของผีเสือกลางวันในเส้นทางที่ 2 พบว่ามีความสอดคล้องกับเส้นทางที่ 1 ทั้งจำนวนประชากรและชนิด โดยพบทั้งหมด 376 ตัว 100 ชนิด และวงศ์พื้นที่เสือขาน้ำพุมีประชากรมากที่สุดเช่นกัน โดยเส้นทางที่ 2 นั้นจะมีพืชกลุ่มไผ่ขันสลับกับป่าเบญจพรรณทำให้สภาพป่าไม่รกราก เช่นกัน สอดคล้องกับรายงานของ Vu and Vu (2011)²² ที่รายงานว่าถ้าสภาพป่าไม่รกรากที่บกจนเกินไป และพื้นที่นั้นมีการburning จากกิจกรรมของมนุษย์จะส่งผลทำให้พบผีเสือกลางวันค่อนข้างสูง

ความหลากหลายของผีเสือกลางวันในเส้นทางที่ 1 มีค่าความหลากหลายสูงตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจในเส้นทางที่ 2 โดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูร้อนและต้นฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีมีนต์น้ำมีการแตกกิ่งก้านสาขามียอดอ่อนที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งอาหารสำหรับตัวอ่อนของผีเสือกลางวัน^{23,24,25} อีกทั้งสภาพพื้นที่ป่าของทั้ง 2 เส้นทาง ของอุทยานแห่งชาติภูเรือมีความสมบูรณ์ และมีสภาพป่าที่ไม่รกรากมาก จึงทำให้พบความหลากหลายของผีเสือกลางวันได้สูงมาก แต่จำนวนผีเสือกลางวันทั้งชนิดและประชากรนั้นจะลดลงในช่วงฤดูฝน เนื่องจากมีความชื้นสูงและไม่มีแสงแดดเพียงพอที่จะทำให้ผีเสือกลางวันออกหากหากปีก โดยผลการสำรวจนี้สอดคล้องกับ พงศ์เทพ²⁶ ที่พบว่าช่วงเดือนกันยายนจะพบความหลากหลายของผีเสือกลางวันน้อย เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้มีความชื้นสูงพักทึบ จึงทำให้ระบะตัวอ่อนของผีเสือกลางวันเข้าสู่ระยะพักตัว จึงเป็นผลให้จำนวนชนิดและประชากรของสังคมผีเสือกลางวัน จึงลดลงตามไปด้วย กิตติ และคณะ¹⁹ ทำการศึกษาความหลากหลายของผีเสือกลางวันในเขตป่าชุมชน อำเภอภูเรือ มีความหลากหลายสูงมากเช่นกัน ซึ่งจำนวนชนิดมีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่สำรวจพบในอุทยานแห่งชาติภูเรือ เนื่องจากสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตจึงพบความหลากหลายได้มาก แต่จำนวนชนิดน้อยกว่าผีเสือกลางวันที่พบบริเวณน้ำตกในพื้นที่มารดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งพบทั้งหมด 306 ชนิด ที่ทำการศึกษาโดย พงศ์เทพ²⁶

การกระจายของผีเสือกลางวันในเส้นทางที่ 1 ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 มีการกระจายตัวสม่ำเสมอในเกณฑ์ที่สูง สอดคล้องกับการกระจายตัวของผีเสือกลางวันในเส้นทางที่ 2 ที่อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน แสดงว่าให้เห็นว่าผีเสือกลางวันในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือมีความหลากหลายสูงและมีการกระจายได้อย่างสม่ำเสมอตลอด

ทั้งปีไม่ว่าจะในสั้นทางได แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของผีเสื้อกลางวัน โดยเฉพาะผีเสื้อกลางวันในวงศ์ผีเสื้อขาหน้าฟูและวงศ์ผีเสื้อหนอนกะหลา และอาจจะเป็นผลมาจากการพากินที่อยู่อาศัยทั้งสองเส้นทางที่มีป่าไม้รกรากมากซึ่งส่งผลกระทบต่อการกระจายของผีเสื้อกลางวัน¹⁶

ผีเสื้อกลางวันที่มีความชุกชุมมากที่สุดได้แก่ *Ypthima baldus baldus* (Fabricius, 1775) (ผีเสื้อสีตาลจุดดาห้าธรรมชาติ) อาจจะเป็นเพราะว่ามีพืชอาหารที่มาก อีกทั้งสภาพป่าที่มีความรกรากทึบเป็นบางช่วงและบางช่วงเป็นป่าไม้รกรากมากซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Vu and Vu (2011)²² ที่กล่าวว่าสภาพป่าไผ่น้ำพบผีเสื้อสีตาลจุดดาห้าธรรมชาติมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับป่าธรรมชาติที่มีความรกรากมากกว่าป่าไผ่^{11,27}

เมื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงของผีเสื้อกลางวันทั้งสองเส้นทาง พบร่วมกันที่มีความคล้ายคลึงกันปานกลาง อาจเป็น เพราะว่าสภาพความรกรากทึบของป่าทั้งสองเส้นทางนั้นมีความแตกต่างกัน ทำให้แสลงแตกต่างกัน สำหรับป่าทั้งสองเส้นทางนั้น มีความแตกต่างกันตามไปด้วย โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกหัวยี่ไผ่จะมีความรกรากทึบเป็นบางช่วงเนื่องจากมีป่าไม้ไผ่ขึ้นสลับ จึงทำให้โอกาสในการพบผีเสื้อกลางวันบางชนิดในเส้นทางนี้มีน้อยตามไปด้วย แต่เมื่อพิจารณาความคล้ายคลึงพบว่าผีเสื้อกลางวันของทั้งสองเส้นทางมีความคล้ายคลึงกันปานกลาง เนื่องจากมีป่าเบญจพรรณขึ้นสลับทั้งสองเส้นทาง และอีกประการหนึ่งนั่นก็คือบางช่วงของเส้นทางมีป่าสนเข้าที่มีความรกรากทึบน้อย เช่นกันทำให้พบหญ้าและพืชตระกูลถั่วที่เป็นอาหารอย่างดีสำหรับผีเสื้อ왕ศ์ผีเสื้อสีน้ำเงิน นอกจากนี้ระดับความสูงจากน้ำทะเลของทั้งสองเส้นทางอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผีเสื้อกลางวันของทั้งสองเส้นทางมีความคล้ายคลึงกันปานกลาง²⁷

สรุปได้ว่าผีเสื้อกลางวันเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ มีความหลากหลายในเกณฑ์สูง แต่มีความคล้ายคลึงกันปานกลาง เนื่องมาจากสภาพปานกลางนั้นยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก จึงทำให้ผีเสื้อกลางวันมีความหลากหลายสูงตามไปด้วย ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ²⁹ ซึ่งผีเสื้อกลางวันนั้นสามารถเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี^{3,13,16,30,31,32}

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณแผ่นดิน และสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบพระคุณ นายรณรงค์ คำมาตรย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ช่วยเหลือในการ

สำรวจและเก็บตัวอย่าง นายนพชรณ์ ทับทิม หัวหน้าศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้อนุเคราะห์ในการระบุชุดผีเสื้อกลางวัน ขอขอบคุณผู้ช่วยนักวิจัยทุกท่าน

เอกสารอ้างอิง

1. Mound LA, Waloff N. Diversity of insect faunas. Symposia R Entomol Soc Lond 1978;9:89-104.
2. Ricketts TH, Daily GC, Ehrlich PR. Does butterfly diversity predict moth diversity? Testing a popular indicator taxon at local scales. Biol Cons 2002;103: 361-70.
3. Schulze CH, Waltert M, Kessler PJA, Pitopang R, Shahabuddin, Veddeler D et al. Biodiversity indicator groups of tropical land-use systems: comparing plants, birds, and insects. Ecol Appl 2004;14(5):1321-33.
4. Nganso BT, Kyerematen R, Obeng-Ofori D. Diversity and abundance of butterfly species in the Abiriw and Odumante Sacred Groves in the eastern region of Ghana. Res Zool 2012;2(5):38-46.
5. Sodhi NS, Koh LP, Brook BW, Peter KLNg. Southeast Asian biodiversity: an impending disaster. Trends Ecol Evolut 2004;19(12): 654-60.
6. Sodhi NS, Brook BW. Southeast Asia biodiversity in crisis. Cambridge: Cambridge University Press; 2006.
7. Sodhi NS, Posa MRC, Lee TM, Bickford D, Koh LP, Brook BW. The state and conservation of Southeast Asian biodiversity. Biodivers Conserv 2010;19:317-28.
8. Koh LP, Kettle CJ, Sheil D, Mbarara, Kabale, Bogor et al. Biodiversity state and trends in Southeast Asia. Elsevier. 2013;509-27.
9. Leps J, Spitzer K. Ecological determinants of butterfly communities (Lepidoptera, Papilionoidea) in the Tam Dao Mountains, Vietnam. Acta Entomol Bohemoslov 1990;87:182-194.
10. Lien VV, Yuan D. The differences of butterfly (Lepidoptera, Papilionoidea) communities in habitats with various degrees of disturbance and altitudes in tropical forests of Vietnam. Biodivers Conserv 2003;12:1099-111.
11. Lien VV, Abeh B. Diversity of butterfly in a tropical rainforest of Van Ban Nature Reserve, Lao Cai

- Province, Vietnam (Lepidoptera: Rhopalocera). *Russ Entomol J* 2011;20(4):411-8.
12. Yong DL, Lohman DJ, Wee C, Lan G, Susan Q, Lim LH. Tropical butterfly communities on land-bridge islands in Peninsular Malaysia. *Raffles Bull Zool* 2012;25:161–172.
 13. Winarni NL. The importance of detectability in butterfly monitoring: butterfly diversity of Lambusango Forest, Buton, Southeast Sulawesi. National Insect Conference. Bogo: 2007. p. 1-12.
 14. Tabadepu H, Buchori D, Sahari B. Butterfly record from Salak Mountain, Indonesia. *J Entomol Indon* 2008;5(1):10-6.
 15. Ardhiashsyah MA. The diversity of butterfly in ancient volcano mount of Nglanggeran Yogyakarta. Proceeding of the 3rd International Conference on Biology, Environment and Chemistry (ICBEC); 2012 Nov 24-25; Bangkok. Thailand: 2012. p. 30-2.
 16. Nisa ARK, Mukti M, Hamzah MF, Mustakim A, Abidin Z. Butterflies diversity in green open space of Malang City, East Java Province, Indonesia. *JTLS* 2013;3(2): 104-7.
 17. Mohagan AB. Diversity and status of butterflies across vegetation types of Mt. Hamiguitan, Davao Oriental, Philippines. *Asian J Biodivers* 2010;2094-15019:1-24.
 18. Ek-Amnuay P. Butterflies of Thailand. 2nd Edition. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน); 2012.
 19. กิตติ ตันเมืองปัก. ความหลากหลายของผีเสื้อในเขตริมแม่น้ำเจ้าพระยา. ใน: รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8. หอประชุมพญาไท เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา. พะเยา: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา; 2559. หน้า 155-161.
 20. Pollard E, Yates TJ. Monitoring butterflies for ecology and conservation. Chapman and Hall, London. 1993; 274 pp.
 21. Heip CHR, Herman PMJ, Soetaert K. Indices of diversity and evenness. *Oceanis* 1998;24(4):61-87.
 22. Vu LV, Vu CQ. Diversity pattern of butterfly communities (Lepidoptera, Papilionidae) in different habitat types in a tropical rain forest of southern Vietnam. *ISRN Zoology* 2011;1-8.
 23. Tiple AD, Khurad AM, Dennis RHL. Butterfly diversity in relation to a human-impact gradient on an Indian University Campus. *Nota Lepid* 2007;30(1): 179–88.
 24. Tiple AD, Khurad AM. Butterfly species diversity, habitat and seasonal distribution in and around Nagpur City, Central India. *W J Z* 2009;4(3):153-62.
 25. Arya MK, Dayakrishna, Chaudhary R. Species richness and diversity of butterflies in and around Kumaun University, Nainital, Uttarakhand, India. *J Entomol Zool Stud* 2014;2(3):153-9.
 26. พงศ์เทพ สุวรรณารี. การเปรียบเทียบความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันของน้ำตกบางแห่งในพื้นที่มรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่. งานวิจัยสาขาวิชาชีววิทยา สำนักวิชาชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2555.
 27. Majumder J, Lodh R, Agarwala BK. Butterfly species richness and diversity in the Trishna Wildlife Sanctuary in South Asia. *J Insect Sci* 2012;13:1-13.
 28. Sanchez-Rodriguez JF, Baz A. The effects of elevation on the butterfly communities of a Mediterranean Mountain, Sierra de ja v Alambre, Central Spain. *J Lepid Soc* 1995;49(3):192-207.
 29. Houlihan PR, Harrison ME, Cheyne SN. Impacts of forest gaps on butterfly diversity in a Bornean Peat-Swamp Forest. *J Asia Pac Entomol* 2013;16:67–73.
 30. Kunte KA. Butterflies of Peninsular India. India: Indian Academy of Sciences, Universities Press (India) Limited; 2000. 254 pp.
 31. Aluri JSR, Rao SP. Psychophily and evolution consideration of *Cadaba fruticosa* (Capparaceae). *JBNHS* 2002;99(1):59-63.
 32. Thomas JA. Monitoring change in the abundance and distribution of insects using butterflies and their indicator groups. *Phil Trans R Soc* 2005;360:339–57.
 33. วิกิพีเดีย. แผนที่ประเทศไทย. Wikipedia [serial online]; 2556 เมษายน;[2 screens] สืบค้น จาก http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphoe_4207.png. สืบค้นเมื่อ สิงหาคม 1, 2556.
 34. กูเกิลเออร์ช. อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย. Google Map [serial online] 2557 มีนาคม; [1 screen] สืบค้น จาก <https://maps.google.co.th/maps?q=%E0%>. สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 15, 2557.