

Multiple Pregnancy in Srinagarind Hospital.

การตั้งครรภ์แฝดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

Yuthapon Werawatakul 1

1. Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University., M.D.,

1. , ,

Retrospective study of multiple pregnancies in Srinagarind Hospital from July 1977 to December 1986 revealed 156 twin pregnancies and 1 triplet pregnancy. The incidence of twins and triplets was 1:118 and 1:18363 births respectively. Maternal age ranged from 16 to 42 years with the majority between 26-30 years, in gravida 2 and parity 0. There were high incidence of no antenatal care, preterm delivery and undiagnosed cases in antepartum period. The fetal presentation during labor were vertex, vertex in 52.9%, only 28% had normal delivery of both fetuses and the incidence of operative obstetrics was high. The most common obstetrics complication was preterm delivery. The incidence of cesarean section in multiple pregnancies was 14.6%. Most of the mothers were hospitalized for 3 days. Sex ratio of twins was 108. There were 72% low birth weight fetuses. Neonatal death among the fetuses weighed less than 1,500 grams was 59% and the survivors required long intensive care in the neonatal unit.

จากการศึกษาย้อนหลังในผู้คลอดครรภ์แฝดของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งแต่กรกฎาคม 2520 ถึง ธันวาคม 2529 พบว่ามีผู้คลอดครรภ์แฝดคู่ 156 ราย และครรภ์แฝดสาม 1 ราย คิดเป็นอุบัติการณ์การคลอดครรภ์แฝดคู่ และครรภ์แฝดสามเป็น 1:118 และ 1:18363 ของการคลอดตามลำดับ ผู้คลอดครรภ์แฝดมีอายุตั้งแต่ 16-42 ปี โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี เป็นการตั้งครรภ์ครั้งที่สอง และยังไม่เคยมีบุตรมาก่อนผู้คลอดครรภ์แฝดยังมีอุบัติการณ์การไม่เคยฝากครรภ์การคลอดก่อนกำหนดรวมทั้งการไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะครรภ์แฝดในระยะก่อนคลอดสูง ส่วนนำของทารกแฝดขณะคลอดพบว่าเป็นท่าศีรษะทั้งคู่มากที่สุด คือร้อยละ 52.9 เป็นการคลอดปกติทั้งคู่ร้อยละ 28 และมีอุบัติการณ์ของสูติศาสตร์หัตถการชนิดต่าง ๆ สูง ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบมากที่สุดคือ การคลอดก่อนกำหนดอุบัติการณ์การผ่าท้องทำคลอดในครรภ์แฝดเป็นร้อยละ 14.6 ระยะเวลาที่ผู้คลอดอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยาวนาน 3 วัน สัดส่วนของเพศในทารกแฝดคู่ชายต่อหญิงเป็น 108 ต่อ 100 ทารกแฝดร้อยละ 72 มีน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ในกรณีที่น้ำหนักต่ำกว่า 1,500 กรัม จะมีอุบัติการณ์การเสียชีวิตในระยะแรกเกิดถึงร้อยละ 59 และในรายที่รอดชีวิตทุกรายต้องได้รับการดูแลในหน่วยทารกแรกคลอดเป็นระยะเวลาสั้น

Article Option

-  Extract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles in this topic collection

- ⌘ Heman Genome Project and Infertility Practice (โครงการจีโนมมนุษย์กับการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก)
- ⌘ Hypersensitivity Reactions Induced by Paclitaxel : Focus on Premedication (การให้ยาป้องกันการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reactions) จากยา Paclitaxel)
- ⌘ Prevalence of Anemia in Pregnant Women at Srinagarind Hospital (ความชุกของภาวะเลือดจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
- ⌘ Molar Pregnancy in Srinagarind Hospital (ภาวะครรภ์ไขปลาลูกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์)

[<More>](#)

This article is under
this collection.

⌘ Obstetric and Gynecology