

Eosinophilic meningoencephalitis in adult

โรคเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ อีโอซิโนฟิลิกในผู้ใหญ่

Verajit. Chotmongkok 1

1. Division of Neurology, Department of Medicine, Srinagarind Hospital,, M.D.,

1. , ,

Retrospective studies of 50 cases with eosinophilic meningoencephalitis who were admitted in Department of Medicine, Srinagarind Hospital during February 1984 to April 1987 were performed. Age incidence was range from 15 years to 91 years, male to female ratio was 1.38 : 1. Most of them lived in Khn Kaen and nearby provinces. There was no seasonal variation. The main presenting symptoms were severe headache and nausea/vomiting respectively. Meningeal signs were found in 71.1%. About half of them had history of eating uncooked snail and incubation period was ranged from 1 day to 30 days. Abnormalities in cerebrospinal fluid were nonspecific. Almost all of them was improved by lumbar puncture for releasing intracranial pressure and other supportive treatment. Coma was the poor prognostic sign.

เป็นการศึกษาย้อนหลังผู้ป่วยโรค Eosinophilic meningoencephalitis ที่รับไว้รักษาในภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2527 ถึงเดือน เมษายน 2530 มีจำนวน 50 ราย อายุระหว่าง 15-91 ปี อัตราส่วนเพศชาย : หญิง เป็น 1.38 : 1 ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียงในภาคอีสาน, อุบัติการณ์เกิดขึ้นได้ตลอดปี อาการสำคัญคือ ปวดศีรษะมาก, คลื่นไส้ อาเจียนและอาการทางระบบประสาทอื่น ๆ พบอาการระคายเคืองของเยื่อหุ้มสมองร้อยละ 71.1, มีประวัติกินหอยดิบ ร้อยละ 51.1 ระยะเวลาที่กินหอยดิบจนถึงเกิดการระหว่าง 1 วัน ถึง 1 เดือน ความผิดปกติของน้ำไขสันหลังไม่มีลักษณะจำเพาะพิเศษอื่น ๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นเมื่อได้รับการเจาะหลังเพื่อลดความดันในสมองและการรักษาประคับประคอง พยากรณ์โรคไม่ดีในรายทั้งหมด

Article Option

-  Extract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.