

Acute Rheumatic Fever in Adults : A Retrospective Clinical Analysis of 21 patients

โรคไข้รูมาติกในผู้ใหญ่ : การศึกษาย้อนหลังถึงลักษณะทางคลินิก ในผู้ป่วย 21 ราย

Ratanavadee Nanagara (รัตนาดี ณ นคร) 1

Article Option

-  Abstract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.

ได้ทำการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 15 ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Acute Rheumatic Fever และได้รับการรักษาที่ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2530 มีผู้ป่วยทั้งหมด 21 รายอายุเฉลี่ย 22 ปีอัตราส่วนหญิง : ชาย = 1 : 1.3 ส่วนใหญ่มีประวัติของ Acute Rheumatic attacks มาก่อน อาการสำคัญที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งได้แก่ carditis (80%) อันดับสองได้แก่ arthritis (47%) ผู้ป่วยที่มี carditis ส่วนใหญ่ฟังได้ murmur (82%) โดยเกิดจาก Mitral regurgitation และ Mitral stenosis ในอัตราส่วนที่เท่ากัน การเกิด carditis นั้นอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหรือเกิดซ้ำในผู้ป่วยที่เป็น rheumatic heart disease มาก่อนก็ได้การรักษาส่วนใหญ่ได้ผลดีไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในระหว่างที่เกิด acute rheumatic attacks อาการแสดงทางคลินิกอื่นๆ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการเกิดซ้ำจะได้กล่าวและวิจารณ์ในรายละเอียดต่อไป

A retrospective clinical analysis of adult acute rheumatic fever was performed in 21 patients who were admitted in Srinagarind Hospital between 1984-1987. The mean age was 22 yr, sex ratio was F:M = 1:1.3 and most of them had previous rheumatic attacks. The most common major criteria was carditis (80%) and the second was arthritis (47%). Most of carditis patients had auscultatory murmurs (82%). Mitral regurgitation and mitral stenosis were equally found. The carditis could occur as the new carditis or on-top preexisting rheumatic heart diseases. All or the patients responded well to therapy and no one died in the acute phase of acute rheumatic attack. Other clinical manifestations, laboratory findings, antibiotic prophylaxis and relapse are discussed in details.

[... Full text.](#)