

Clinical Characteristics of Pregnant Women with Anencephalic Fetuses In Srinagarind Hospital and Problems in Management

ลักษณะทางคลินิกของผู้คลอดทารกพิการ ชนิดไม่มีกระโหลกศีรษะในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และปัญหาในการดูแลรักษา



Yuthapong Werawatakul (ยุทธพงศ์ วีระวัฒน์ตระกูล) 1

Retrospective study of pregnant women with anencephalic fetuses in Srinagarind hospital from July 1977 to December 1987 revealed the total of 28 cases. The incidence of anencephalic fetus was 1 L776 births. Maternal age ranged from 19-38 years with the majority between 26-30 years, in gravida 1 and parity 0. All of the patients had attended antenatal care and most of them were private cases, Thai ethnic and lived in KhonKaen Province. The gestational ages at the times of termination of pregnancy varied widely. Prenatal diagnosis of these anomalies could be made in only 46.4% of the patients by using radiographic examination in the majority of cases. The cesarean cases were unable to diagnose rate in these patients was 21.4%. All of the cesarean cases were unable to diagnose prenatally due to unawareness of this condition. The most common obstetric complication was polyhydramnios. Female to male ratio was 1 : 1.45. The biggest anencephalic fetus weighed 3,370 grams. Some of anencephalic fetuses also had another associated anomalies.

จากการศึกษาย้อนหลังในผู้คลอดทารกพิการชนิดไม่มีกระโหลกศีรษะของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตั้งแต่ กรกฎาคม 2520 ถึงธันวาคม 2530 พบว่ามีทั้งสิ้น 28 รายคิดเป็นอุบัติการณ์ของการคลอดทารกพิการชนิดไม่มีกระโหลกศีรษะ 1: 776 ของการคลอดผู้คลอดดังกล่าวมีอายุตั้งแต่ 19-38 ปีส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปีเป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรกและยังไม่เคยมีบุตรมาก่อนผู้คลอดทารกพิการชนิดไม่มีกระโหลกศีรษะทุกรายเคยฝากครรภ์และส่วนใหญ่เป็นคนที่ใช้พิเศษภูมิลำเนาส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นและมีเชื้อชาติไทยอายุครรภ์ขณะสิ้นสุดการตั้งครรภ์แตกต่างกันค่อนข้างมาการวินิจฉัยภาวะทารกพิการชนิดนี้ได้ในระยะก่อนคลอดมีเพียงร้อยละ 46.4 ซึ่งส่วนใหญ่วินิจฉัยได้จากภาพถ่ายรังสีมีการผ่าท้องทำคลอดถึงร้อยละ 21.4 ของผู้คลอดที่ตั้งครรภ์ทารกพิการชนิดนี้ซึ่งสาเหตุสำคัญของการผ่าท้องทำคลอดเนื่องจากไม่ได้คิดถึงภาวะแทรกซ้อนแต่กำเนิดชนิดนี้ทำให้วินิจฉัยไม่ได้ในระยะก่อนคลอดภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ที่พบมากที่สุดคือภาวะครรภ์แฝดน้ำสัดส่วนเพศของทารกหญิง : ชายเท่ากับ 1: 1.45 ทารกที่มีน้ำหนักมากที่สุดคือ 3,370 กรัม ทารกดังกล่าวบางรายยังมีความพิการอื่น ๆ ร่วมด้วย

[... Full text.](#)

Article Option

-  Abstract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.