



Evaluation family planning of married women who have child in rural area

โครงการวิจัยเรื่อง : การประเมินผลการวางแผนครอบครัวของสตรีที่มีบุตรแล้ว ใน เขตชนบทอีสาน

Pontip Kompor (พรทิพย์ คำพอ) 1

Article Option

-  Abstract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.

The purpose of this study was evaluation of family planning of married women who have child in rural area. This study was The Third Stage of the project "Village health workers in prevention and control disease at village level in rural area" which started since April , 1982 for comparing the research results in Mahasarakham covering two districts of 16 subdistricts in the rural area. The source of data for this study is interview currently married women who have child age 0-5 years old on January-February , 1987. The results of 1982 are compared with results of 1987 as following. The percentage of female sterilization and male sterilization declined. Female sterilization from 36.1 to 30.9 percent and male sterilization from 1.2 to 0.6 percent. The most widely used contraception is female sterilization 30.9 percent, IUD 24.1 percent and male Sterilization 0.6 percent. The proportion of currently married women who had ever used method of contraceptive declined from 29.9 percent to 26.9 percent. The results from the preceding analysis that women in rural area have achieved incredible results both in term of acceptance and reduced fertility, There is still a considerable amount of work to be done.

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการประเมินผลการวางแผนครอบครัวของสตรีที่มีบุตรแล้วในเขตชนบทเป็นการศึกษาต่อเนื่องระยะที่ 3 ที่ต้องประเมินผลการศึกษาของโครงการ "Village health workers in prevention and control disease at village level in rural area" ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2525 เพื่อเป็นการประเมินผลและเปรียบเทียบผลการวิจัยที่ได้ศึกษาไว้แล้วในหมู่บ้าน 16 แห่งของจังหวัดมหาสารคามที่อยู่ในเขตอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอเขียงยืนโดยได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์สตรีที่สมรสแล้วเป็นมารดาของเด็กที่มีอายุ 0-5 ปีทั้งหมดเมื่อเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2530 การเปรียบเทียบผลการวิจัยปี พ.ศ. 2525 กับปี พ.ศ. 2530 พบว่าอัตราส่วนการทำหมันหญิงและการทำหมันชายลดลงคืออัตราการทำหมันหญิงจากเดิมร้อยละ 36.1 เป็นร้อยละ 30.9 อัตราการทำหมันชายจากเดิมร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 0.6 และวิธีการป้องกันการปฏิสนธิที่สตรีใช้มากที่สุดคือ การทำหมันหญิงร้อยละ 30.9 รองลงมาได้แก่ วิธีการใส่ห่วงอนามัย ร้อยละ 24.1 วิธีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดคือการทำหมันชาย ร้อยละ 0.6 สตรีที่ไม่ใช้วิธีการป้องกันการปฏิสนธิลดลงมาเดิมร้อยละ 29.9 เป็นร้อยละ 26.9 แสดงว่าสตรีในชนบทยอมรับบริการวางแผนครอบครัวอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

[... Full text.](#)