

Below-the-Knee Amputation by Extern.

การตัดขาใต้เข่าโดยนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ

Polasak Jeeravipoolvarn (พลศักดิ์ วีระวิฑูรธรรม) 1, Banchong Mahaizavariya (บรรจง มไหสวริยะ) 2, Sakda Chaikitpinyo (ศักดิ์ชา ไชกิจภิญโญ) 3, Weerachai Kowsuwon (วีระชัย ไควสุวรรณ) 4

This is a prospective study of sixty long posterior flap below-the-knee amputations done by the KhonKaen University externs under closed Supervision of qualified orthopedists. Post-operatively red rubber bulb drainage was used instead of the hemovac. The patients were all leprotic and held in custody by Nonsomboon Leprosarium. Twenty-nine cases were affected by malignant change of the long standing trophic ulcer, while 29 had chronic ulceration and osteomyelittis of the tarsal bones with useless deformed feet. One was due to painful Boyd's stump and the other form persistent infection after tranmetatarsal amputation. Eighteen cases of stitch abscess and two cases of hematoma collection were detcteted but no any wound disruption were seen in our series.

การศึกษาแบบวางแผนล่วงหน้าของการตัดขาใต้เข่าแบบ long posterior flap และใช้ลูกยางแดงดูดระบายเลือดแทนเครื่องระบายสารเหลวจากแผลแบบ Hemovac ที่ทำโดยนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของศัลยแพทย์ออร์โทปีดิกส์ ในผู้ป่วยโรคเรื้อน 60 คนที่สถานพยาบาลโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึง 2530 เป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง 29 ราย เป็นบาดแผลเรื้อรังรักษาไม่หายและเท้าใช้งานไม่ได้ 29 รายเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเท้าแบบ Boyd แล้วล้มเหลว 1 รายและเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเท้าออกระดับกระดูกฝ่าเท้าแล้วมีการติดเชื้อรุนแรงควบคุมไม่ได้ 1 ราย ผลการรักษาพบว่าเป็นฝีจากไหม 18 ราย มีก้อนเลือดค้างในแผล 2 รายและทุกรายบาดแผลสามารถหายได้ในที่สุดไม่มีโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงเลยในการศึกษานี้

... Full text.

Article Option

-  Abstract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.