

## การกลับเป็นซ้ำหลังทำผ่าตัดรักษามะเร็งปากมดลูก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ประสิทธิ์ เพ็งสา 1, บรรจง อุดมถาวรสุข 2, วิทยา ศิลาพันธ์ 3, สมพร โทธินาม 4

ได้ศึกษาภาวะการกลับเป็นซ้ำหลังทำผ่าตัดรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่ I และ II A โดยวิธี radical hysterectomy และเอาต่อมน้ำเหลืองของอุ้งเชิงกรานออกด้วยโดยรวบรวมผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2531 รวม 218 ราย พบว่า อุบัติการณ์การกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยทั้งหมดมี 9.10% เป็นผู้ป่วยในระยะที่ IB 8.40% เป็นผู้ป่วยระยะ II A 19.40% ไม่มีผู้ป่วยระยะ I A กลับเป็นซ้ำเลย บริเวณที่กลับเป็นซ้ำ พบบริเวณอุ้งเชิงกรานส่วนกลาง 45% บริเวณอุ้งเชิงกรานรอบนอก 15% ในช่องท้อง 15% และบริเวณไกลออกไป 25% ลักษณะเซลล์มะเร็งที่พบในกลุ่ม squamous cell carcinoma พบกลับเป็นซ้ำ 9.09% และกลุ่ม adenocarcinoma 16.13% กลุ่มที่มีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองมีการกลับเป็นซ้ำ 15.20% และกลุ่มที่ไม่มีการกระจายมีการกลับเป็นซ้ำ 8.10% การรักษาและผลการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้นำเสนอต่อไป

Recurrent patterns after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy for cervical cancer stage I and II A were analysed. The data collected from 1976 upto June 30 , 1988 , with the total 218 cases operated. The incidence of recurrence in this series was 9.10% ., 8.40%for stage I B, 19.40% for stage II A and no patient with stage I A recurred. There were 45% with central pelvic recurrences, 15% with pelvic sidewall recurrences , 15% with intraabdominal recurrences and 25% with distant recurrences. The recurrent rate in squamous cell carcinoma was 9.09% and adenocarcinoma 16.13% Those who had positive lymph nodes recurred in 15.20% and those who had negative nodes recurred in 8.10 % The treatment after recurrence will be presented.

[. . . Full text.](#)

Article Option

-  Abstract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles  
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under  
this collection.