

## Effect of tourniquet

### ผลของการรัดเพื่อห้ามเลือด

วินัย ศิริชาติวาทย์ 1

ในการผ่าตัดบริเวณแขนขา โดยเฉพาะบริเวณมือ การทำให้บริเวณผ่าตัดปราศจากเลือด(bloodless operative field) นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการหา เย็บซ่อมแซม โครงสร้างต่างๆเช่น เส้นเอ็น เส้นประสาทและหลอดเลือด เป็นต้นอีกทั้งยังช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างราบรื่นมีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่ออ่อนน้อยซึ่งจะลดปัญหาการติดแน่นหลังการผ่าตัด (postoperative adhesion) วิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการใช้ tour-niquet ช่วยห้ามเลือดในระหว่างการผ่าตัด ซึ่งต้องใช้ด้วยความระมัดระวังต้องคำนึงอยู่เสมอถึงผลและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ tour-niquet . . . [Full text.](#)

Article Option

-  Abstract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles  
in this topic collection

- ⌘ An Analysis of Orthopedic Injury Profiles of Pedestrian-Motor Vehicle in District Hospital (การวิเคราะห์รูปแบบภัยอันตรายทางออร์โธปิดิกส์ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในโรงพยาบาลชุมชน)
- ⌘ Risk Factors Analysis of Gram-Negative Osteomyelitis (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อกรัมนลบในโพรงกระดูก)
- ⌘ Prevalence of Vitamin D Deficiency among Postmenopausal Women at Srinagarind Hospital, Khon Kaen Province, Thailand. (ความชุกของภาวะขาดวิตามินดีในสตรีวัยทองที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น)
- ⌘ Appropriate Tibial Tunnel Angle and Knee Flexion Angle for Aiming Femoral Insertion in Endoscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction (มุมอิมองค์ที่กระดูกเข้ง และมุมงอเข่าที่เหมาะสมในการเล็งจุดเกาะของเอ็นไขว้หน้า)

<More>

This article is under  
this collection.

⌘ Orthopedics