

Common Pitfalls in Trauma Management

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ

Chaiyut Thanapaisal (ไชยยุทธ ธนไพศาล) 1

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การบาดเจ็บเป็นสาเหตุของการตายในอันดับต้น ๆ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความพิการ ความสูญเสียทรัพย์สินและปัญหาอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจึงเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างระมัดระวัง และต้องมีความรู้ที่ชัดเจนแม่นยำ คำว่า common pitfalls ในที่นี้หมายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ ในระหว่างการดูแลรักษา ซึ่งแพทย์ควรจะต้องพยายามแก้ไขหรือขจัดข้อผิดพลาดเหล่านี้ออกไป เพื่อลดอัตราการตายและอัตราการพิการให้เหลือน้อยที่สุด

สาเหตุของการบาดเจ็บที่สำคัญคืออุบัติเหตุจราจร การทำร้ายร่างกาย การพลัดตกหกล้ม การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและการกีฬา การตายเนื่องจากการบาดเจ็บแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ตามระยะเวลาได้เป็น 3 กลุ่มคือ

1. การเสียชีวิตทันทีในเวลาเป็นวินาทีหรือนาทีภายหลังจากการบาดเจ็บ สาเหตุมักเกิดจากการบาดเจ็บที่รุนแรงต่ออวัยวะที่สำคัญ เช่น การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง การฉีกขาดของเส้นเลือดใหญ่หรือหัวใจ เป็นต้น
2. การเสียชีวิตในเวลา นับเป็นชั่วโมงภายหลังจากการบาดเจ็บ สาเหตุมักเกิดจากการเสียเลือด เช่น ตับหรือม้ามฉีกขาด การตกเลือดในช่องปอด กระดูกเชิงกรานแตกหัก เป็นต้น
3. การเสียชีวิตในเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ภายหลังจากการบาดเจ็บ สาเหตุมักเกิดจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ปอดบวม มีโพรงหนองในช่องท้อง ไตวาย เป็นต้น

เป้าหมายของการดูแลรักษาคือการลดอัตราการตายและอัตราการพิการ โดยเฉพาะในผู้บาดเจ็บกลุ่มที่ 2 และ 3 สำหรับในกลุ่มที่ 2 การดูแลในระยะก่อนถึงโรงพยาบาลจะมีความสำคัญอย่างมาก ในขณะที่กลุ่มที่ 3 ความสำคัญจะอยู่ที่การดูแลรักษาภายในโรงพยาบาล

ข้อผิดพลาดในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บจะเกิดขึ้นจาก 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ เกิดจากระบบและเกิดจากตัวบุคคล

Article Option

 Extract

 Fulltext

 PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.