

Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament

ภาวะกระดูกพอกของเอ็นกระดูกสันหลังด้านหลัง

Kitti Jiraratnaphochai (กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย) 1

ประวัติและการตรวจร่างกาย

ผู้ป่วยรายที่ 1 ผู้หญิงอายุ 41 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลำเนาจังหวัดมหาสารคาม มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลด้วยอาการปวดต้นคอ แขนขาทั้ง 2 ข้างชา และอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มานาน 3 เดือน ผู้ป่วยเคยไปพบแพทย์ที่คลินิกได้รับการวินิจฉัยว่ากระดูกทับเส้นประสาทและได้รับยามารับประทานแต่อาการไม่มีขึ้น ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนมาพบแพทย์ครั้งนี้เริ่มกลับมีสภาวะไม่ได้และมีอาการอ่อนแรงมากขึ้น จึงมารับการตรวจที่โรงพยาบาล การตรวจร่างกายพบว่าผู้ป่วยงอคอได้น้อยกว่าปกติ กำลังกล้ามเนื้อของแขนและขาทั้ง 2 ข้างระดับ 3 และ 4 แขนและขาซ้ายอ่อนแรงมากกว่าขวามากกว่า มีอาการชาตั้งแต่ต้นคอลงไป ตรวจพบ reflex ของแขนและขาทั้ง 2 ข้างไวกว่าปกติ ตรวจ Hoffman และ Babinski sign ให้ผลบวกทั้ง 2 ข้าง ไม่พบ clonus การตรวจร่างกายอื่นไม่พบความผิดปกติ

การตรวจภาพเอกซเรย์ของกระดูกต้นคอ พบว่ามีลักษณะเสื่อมตั้งแต่ระดับ C3-C6 และ แนวกระดูกคอกโก้ง (kyphosis)

ผู้ป่วยรายที่ 2 ผู้ป่วยชายอายุ 70 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดเพชรบูรณ์ มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลด้วยอาการปวดต้นคอแขนและขาทั้ง 2 ข้าง ชาและอ่อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ มานาน 3 เดือน บางครั้งมีอาการเกร็งกระดูกของแขนและขาทั้ง 2 ข้างร่วมด้วย ประมาณ 10 วันก่อนมาพบแพทย์ครั้งนี้เริ่มมีอาการอ่อนแรงมากขึ้นและเดินลำบากจึงมารับการตรวจที่โรงพยาบาล

การตรวจร่างกายพบว่าผู้ป่วยเคลื่อนไหวคอได้ปกติ กำลังกล้ามเนื้อของแขนและขาทั้ง 2 ข้างระดับ 3 และ 4 แขนอ่อนแรงมากกว่าขาเล็กน้อยมีอาการชาตั้งแต่ต้นคอกลงไปตรวจพบ reflex ของแขนและขาทั้ง 2 ข้างไวกว่าปกติ ตรวจ Hoffman และ Babinski's sign ให้ผลบวกทั้ง 2 ข้าง ไม่พบ clonus การตรวจร่างกายอื่นไม่พบความผิดปกติ

การตรวจภาพเอกซเรย์ของกระดูกต้นคอพบว่ามีลักษณะเสื่อมตั้งแต่ระดับ C3-C7 และ แนวกระดูกคอกมี Iordosis ปกติ

Article Option

 Extract

 Fulltext

 PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.