

Seizure Disorder in children

อาการชักเกร็งในเด็ก

Niramol Patjanasoonorn (นิรมล พัจนสุนทร) 1

ผู้ป่วยเด็กหญิง อายุ 12 ปี เป็นนักเรียน อยู่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ส่งปรึกษามายังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ด้วยอาการชักเกร็ง แต่ลักษณะเหมือนเกิดจากปัญหาทางด้านจิตเวช จากอาการชักประวัติ ผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลที่ส่งปรึกษา เนื่องจากอาการแน่นหน้าอกใจสั่นหายใจกระตุกและกลัวหัวใจไม่ออกเป็นมากจนต้อง admit ต่อมามีอาการแทรกคือ กระตุกที่ไหล่ และที่ผนังหน้าท้อง รุสติดี้ ไม่มีปีสสาวะราด แพทย์ได้ฉีด valium 10 mg ทางหลอดเลือดเป็นระยะๆ ผู้ป่วยจะหลับไป อาการดีขึ้นสักช่วงที่หลับ เมื่อตื่นขึ้นมาก็จะหายใจเร็ว หอบเหนื่อย และกระตุกต่อ ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลตอนกลางคืนกินอนไม่ได้ มีอาการกระตุกและพูดจาเพ้อว่าเห็นลงที่ตายไปแล้วมาหา ผู้ป่วยมีอาการอยู่ 2-3 วัน อาการไม่หาย ลักษณะการชักไม่เหมือนลมชัก จึงส่งมาจบจิตแพทย์

Article Option

-  Extract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.