

Sexual Intercourse during Pregnancy

เพศสัมพันธ์ระหว่างการตั้งครรภ์

Kovit Compitak (โกวิท คำพิทักษ์) 1

โดยทั่วไปการตั้งครรภ์นับได้ว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการประสบความสำเร็จของการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งการปฏิสนธินั้นมักเกิดจากเกิดการวางแผนและความต้องการร่วมกัน ตลอดจนถึงการมีภาวะการเจริญพันธุ์ที่ปกติของคู่สามีภรรยา ถึงแม้ว่าการตั้งครรภ์บางส่วนอาจเกิดขึ้นในสตรีที่ยังไม่มีความพร้อมหรือมีการวางแผนครอบครัวผิดพลาดหรือไม่ได้แต่งงานอยู่บ้าง

เป็นที่ทราบแล้วว่าความต้องการทางเพศ สิ่งกระตุ้นและการตอบสนองในคนท้องคล้ายกับคนปกติ ถึงแม้ว่าจะไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจนเรื่องเพศสัมพันธ์ระหว่างการตั้งครรภ์ แต่เชื่อว่าปัญหาความผิดปกติทางด้านอารมณ์และความเครียดระหว่างการตั้งครรภ์ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากสาเหตุดังกล่าวช่วงระหว่างการตั้งครรภ์จึงน่าจะเป็นช่วงของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปกติ

มีแพทย์หรือผู้ดูแลผู้ตั้งครรภ์จำนวนมากที่ยังไม่มั่นใจในการให้คำแนะนำแก่ผู้ตั้งครรภ์ เพื่อให้เป็นที่ทราบพร้อมทั้งบทสรุปในการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างการตั้งครรภ์ บทความฉบับนี้จึงได้เขียนขึ้นโดยรวบรวมความรู้จากงานเขียนและงานวิจัยล่าสุด เพื่อเป็นพื้นฐานในการดูแลแนะนำผู้ตั้งครรภ์ต่อไป

Article Option

-  Extract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles
in this topic collection

- ⌘ Heman Genome Project and Infertility Practice (โครงการจีโนมมนุษย์กับการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก)
- ⌘ Hypersensitivity Reactions Induced by Paclitaxel : Focus on Premedication (การให้ยาป้องกันการเกิดภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity reactions) จากยา Paclitaxel)
- ⌘ Prevalence of Anemia in Pregnant Women at Srinagarind Hospital (ความชุกของภาวะเลือดจางในสตรีตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์)
- ⌘ Molar Pregnancy in Srinagarind Hospital (ภาวะครรภ์ไขปลาอุกในโรงพยาบาลศรีนครินทร์)

<More>

This article is under
this collection.

- ⌘ Obstetric and Gynecology