

Perioperative nutrition support : review of published data and recommendations

การทบทวนวรรณคดีทางการแพทย์ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสนับสนุนโภชนาการผู้ป่วยก่อน และหรือหลังการผ่าตัด

Anan sripanuskul (อนัน ศรีพนัสกุล) 1

ภาวะทุโภชนาการในผู้ป่วยศัลยกรรมที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลมีอุบัติการณ์สูงถึง 50% และมีอุบัติการณ์ทุโภชนาการ ชั้นรุนแรง (severe malnutrition) ประมาณ 3-12 % ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้ว มีหลักฐานและเป็นที่ยอมรับกันมานานแล้วภาวะทุโภชนาการในผู้ป่วยศัลยกรรมมีผลเสียต่อการรักษาผ่าตัดเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนและสาเหตุการตายของผู้ป่วยหลังการผ่าตัด กว่า 30 ปี มาแล้วที่ศัลยแพทย์ ได้ให้การสนับสนุนโภชนาการในผู้ป่วยเหล่านี้ก่อนและหลังการผ่าตัด (perioperative nutrition support) เพื่อหวังว่าจะลดอัตราแทรกซ้อน และการตายหลังผ่าตัด ให้เหลือน้อยที่สุด หรือ เทียบเท่ากับผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะทุโภชนาการ แต่จนถึงปัจจุบันการให้ perioperative nutrition support ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้แน่ชัด ยังมีการถกเถียงกันในรายละเอียดอย่างกว้างขวางเช่น วิธีการให้ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า การศึกษาวิจัยทางคลินิกเป็นไปได้ยากลำบาก เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนและอัตราการตายหลังผ่าตัดมีตัวแปรอยู่มากมายไม่เฉพาะแต่ภาวะทุโภชนาการเท่านั้น

Article Option

-  Extract
-  Fulltext
-  PDF File

Another articles
in this topic collection

[<More>](#)

This article is under
this collection.