

นิพนธ์ต้นฉบับ

ลักษณะทางกายวิภาคของเซลล์ผิวของใบไผ่บางชนิด
ในสกุล *Bambusa*, *Dendrocalamus* และสกุล *Gigantochloa*Anatomy of leaf epidermal cells of some Bamboo species
in the genera *Bambusa*, *Dendrocalamus* and *Gigantochloa*

เทพวาลี คำนานทอง*

สมคิด สิริพัฒน์ดิลก

สรารุณ สังข์แก้ว

Thepwalee Khananthong*

Somkid Siripatanadilok

Sarawood Sungkaew

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Faculty of Forestry, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

*Corresponding Author, E-mail: thepwalee70@gmail.com

รับต้นฉบับ 30 พฤษภาคม 2557

รับลงพิมพ์ 22 กรกฎาคม 2557

ABSTRACT

Anatomical structures of the leaf epidermal cells of bamboo could be used as supported information for bamboo classification to be more precisely at a species level. The samples of dried leaves were collected from Bamboo Museum in the Faculty of Forestry and National Science Museum. Fifteen species of Thai bamboo which belong to 3 genera were selected as follows : *Gigantochloa ligulata*, *G. albociliata*, *Bambusa longispiculata*, *B. tulda*, *B. bambos*, *B. vulgaris*, *B. burmanica*, *Dendrocalamus pendulus*, *D. dumosus*, *D. copelandii*, *D. strictus*, *D. membranaceus*, *D. hamiltonii*, *D. brandisii* and *D. khoonmengii*. The collected leaf specimens were prepared basing on standard paraffin techniques, sectioned, stained and mounted to make permanent microscope slides. The sample slides of each species were studied using compound microscope. The results showed that most of epidermis of bamboo normal epidermal cells, bulliform cell, trichomes and stomata. Various shapes of bamboo epidermis of leaves possess crystal were found scattering. Most species, upper normal epidermal cells were similar and two types of bulliform cells; sunken and raised bulliform were found. Fan-shaped silica were found in most bulliform cells of leaves possess normal epidermal cells, bulliform cells, trichomes and stomata. *B. burmanica* whereas no fan-shaped silica observed in on the bulliforms of *D. membranaceus* and *D. pendulus*. Trichomes were numerous and widely distributed both upper and lower epidermis of *B. vulgaris* but found only on the lower side of *D. dumosus*, *D. copelandii*, and *D. hamiltonii*. Furthermore, *D. khoonmengii*, *D. membranaceus*, and *D. strictus* were found thick papillae trichomes in the upper side of epidermal layer however *G. albociliata* was found only 2 trichomes per bulliform range throughout upper epidermis.

Keywords: Anatomy, Epidermal cells, Bamboo, leaf, *Gigantochloa*, *Bambusa*, *Dendrocalamus*

บทคัดย่อ

ลักษณะทางกายวิภาคของเนื้อเยื่อชั้นผิวของใบสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดจำแนกใบในแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ในการศึกษาใช้ตัวอย่างใบไม้แห้งจากพิพิธภัณฑ์ไม้คณะวนศาสตร์และจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ศึกษาเฉพาะไม้ที่พบในประเทศไทยจำนวน 3 สกุล รวม 15 ชนิด ได้แก่ สกุล *Gigantochloa* 2 ชนิด คือ ไม้ด้ามพรว้า (*G. ligulata*) ไม้ไ้ (*G. albociliata*) สกุล *Bambusa* 5 ชนิด คือ ไม้ล้ามะลอก (*B. longispiculata*) ไม้พองดำ (*B. tulda*) ไม้ป่า (*B. bambos*) ไม้เขียว (*B. vulgaris*) ไม้บงหวานเมืองเลย (*B. burmanica*) และสกุล *Dendrocalamus* 8 ชนิด คือ ไม้พรว (*D. pendulus*) ไม้พรวกเขา (*D. dumosus*) ไม้มันหมู (*D. copelandii*) ไม้พองดำ (*D. strictus*) ไม้พองนวล (*D. membranaceus*) ไม้พอก (*D. hamiltonii*) ไม้พองใหญ่ (*D. brandisii*) และ ไม้กระโรม (*D. khookmengii*) ทำการศึกษาโดยทำสไลด์ถาวรด้านตัดขวางของใบ และศึกษาลักษณะเซลล์ผิวภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบว่า เนื้อเยื่อผิวของใบไม้ประกอบด้วยเซลล์ผิวปกติ (normal epidermal cells) เซลล์ย่น (bulliform cells) ขน (trichomes) และปากใบ (stomata) นอกจากนั้นยังมีผลึกซิลิกาแบบต่างๆแทรกอยู่ชั้นเซลล์ผิวแบบปกติด้านบนของใบไม้เกือบทุกชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกันตลอดช่วงของเซลล์ย่น และส่วนใหญ่พบเซลล์ย่นทั้งสองลักษณะคือมีส่วนยอดต่ำกว่าเซลล์ผิว และเซลล์ย่นที่มีส่วนยอดโผล่เหนือเซลล์ผิวด้านบน ไม้พองหวานเมืองเลย พบซิลิการูปพัดในเซลล์ย่นตลอดทั้งแผ่นใบ ไม้พองนวล และ ไม้พรว ไม่พบซิลิกาภายในเซลล์ย่น ไม้เขียว พบขนกระจายทั่วไปที่เซลล์ผิวทั้งสองด้าน แต่ ไม้พรวกเขา ไม้มันหมู และ ไม้พอก พบขนกระจายทั่วไปเฉพาะที่เซลล์ผิวด้านล่าง สำหรับ ไม้กระโรม ไม้พองนวล และ ไม้พองดำ พบตั้งที่ใบ (thick papillae trichome) ที่เซลล์ผิวด้านบน และ ไม้ไ้ ปรากฏขนเพียง 2 ชนิดหนึ่งช่วงของเซลล์ย่นตลอดทั้งแผ่นใบ

คำสำคัญ: กายวิภาคศาสตร์เซลล์ผิว ใบ ไม้สกุล *Gigantochloa* *Bambusa* *Dendrocalamus*

คำนำ

เซลล์ผิว (epidermal cell) มีหน้าที่ป้องกันอันตรายต่อโครงสร้างภายในของใบจากการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อม เซลล์ผิวจึงมีความแปรผันไป เช่น สะสมคิวทิน ลิกนินและน้ำมัน หรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นขนหรือเซลล์อื่นๆ เป็นต้น (Soontornchainaksaeng, 2006) ในพืชกลุ่มหญ้าเซลล์ผิวของใบปรากฏเซลล์ย่น (bulliform cells) ซึ่งเป็นโครงสร้างพิเศษ (Esau, 1977) ภายในประกอบด้วยน้ำแต่พบว่าบางครั้งมีการสะสมสารซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) และเกิดเป็นผลึกซิลิกา (silica bodies) ซึ่งมีรูปร่างคล้ายรูปพัด (fan - shaped silica) เช่นเดียวกับในพืชกลุ่มข้าว (Piperno, 2006) นอกจากผลึกที่ปรากฏภายในเซลล์ย่นในพืชกลุ่มหญ้าพบผลึกซิลิกา (Esau, 1977) ซึ่งมีรูปร่างหลากหลาย ได้แก่ flat towers, two horned towers, long saddle, short

saddle และ saddle ellipsoid (Lu and Liu, 2003) ปากใบ (stomata) พบกระจายที่เซลล์ผิวทั้งสองด้านเท่าๆ กัน (oat type) (Pandy and Chada, 1994) ในพืชกลุ่มหญ้าปรากฏระยางค์ (appendage) ประเภทขน (trichome) แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ macro hairs, micro hairs, prickly hairs และ papillae (Metcalf, 1960) ลักษณะทางกายวิภาคของเซลล์ผิวใบมีลักษณะเด่นในพืช จึงสามารถนำมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจำแนก Chin (1962) ใช้ลักษณะรูปร่างและลักษณะเซลล์ผิวและผนังเซลล์ผิว ขน ผลึกซิลิกา ปากใบ ช่วยในการจัดจำแนก ไม้ พืชสกุล *Petunia* และสกุล *Calibrachoa* ใช้ลักษณะขน ปากใบ ขนาดของเซลล์ผิวในการจัดจำแนก (Reis et al., 2002) ในพืช *Mikania glomerata*, *Porophyllum ruderale* และ *Vernonia condensata* ศึกษาเปรียบเทียบกับปากใบ ขน และผลึก (Milan et al., 2006) พืชสกุล

Cassia ใช้ลักษณะเซลล์กลุ่ม ปากใบและ ขน จัดจำแนก (Saheed and Illoh, 2010) พืชสกุล *Persicaria* ทำการ จัดจำแนกโดยใช้ลักษณะเซลล์ผิว รูปร่างเซลล์ผิว ปาก ใบและ ขน (Yasmin *et al.*, 2010) พืชสกุล *Litsea* จัด จำแนกโดยใช้ปากใบ ต่อมเหงื่อ และ ขน (Paliwal *et al.*, 2012) พืช *Smilax syphililitica* ใช้ลักษณะของเซลล์ ผิวทั้งสองด้าน ปากใบ เซลล์ที่สะสมลิคินิน ผลึกและ นาม (Silva *et al.*, 2012)

อุปกรณ์และวิธีการ

การศึกษาในครั้งนี้ใช้ตัวอย่างใบแห้งใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและองค์การพิพิธภัณฑ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ทั้งสิ้น 3 สกุล 15 ชนิด ชนิดละ 3 ใบ 45 ตัวอย่าง ได้แก่ ไม้ด้ามพริก ไม้ไร่ ไม้ ลามะลอก ไม้งาช้าง ไม้ป่า ไม้เขียว ไม้พุ่มเมืองเลย ไม้หนวด ไม้รวกเขา ไม้มันหมู ไม้ซางดำ ไม้ซาง ไม้หก ไม้บงใหญ่ และ ไม้กระโรม ทำการศึกษาโดยทำสไลด์ ถาวรด้วยวิธีพาราฟิน ย้อมสีด้วย สี Safranin O และ สี Fast green (Siripatanadilok, 1983) ศึกษาลักษณะ ต่างๆ ของเซลล์และวัดขนาดด้วยกล้องจุลทรรศน์ การ ศึกษาโครงสร้างกายวิภาคของใบไม้ทำการศึกษาเฉพาะ ด้านตัดขวางของใบบริเวณกึ่งกลางแผ่นใบ (Figure 1) แบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือการศึกษาลักษณะเซลล์ผิว ด้านบน (UE) และเซลล์ผิวชั้นล่าง (LE) ของใบด้านตัด ขวางโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ compound microscope นับ

จำนวนและวัดขนาดเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ Zeiss – axioskop 40 โดยใช้โปรแกรมวัดขนาดภาพ axioskop 40 ในการนับจำนวนเซลล์และวัดขนาดเซลล์ ทำการวัด 10 ช่วง ในแต่ละใบ โดยวัดทั้งหมด 3 ใบ (ซ้ำ) ซึ่งระยะ หนึ่งช่วงคือ ระยะของเซลล์ชั้นดึ่งซึ่งมีมัดท่อลำเลียง (vascular bundle) อยู่กึ่งกลาง โดยลักษณะที่ศึกษา มี ดังนี้ นับจำนวนเซลล์ผิวและวัดความกว้างเซลล์ผิว นับ จำนวนและวัดความสูงเซลล์ชั้นดึ่งเฉพาะที่เซลล์ผิว ด้านบน นับจำนวนและวัดความกว้างผลึกซิลิกา ที่พบ ที่เซลล์ผิวและซิลิการูปพัด ที่พบในเซลล์ชั้นดึ่ง และนับ จำนวนและวัดความกว้างปากใบนับจำนวนและวัด ความยาวของขน (Figure 1)

ผลและวิจารณ์

ลักษณะทางกายวิภาคตัดตามขวางของใบ ไม้บริเวณกึ่งกลางใบ ในหนึ่งช่วงของเซลล์ชั้นดึ่งซึ่งมี มัดท่อลำเลียงอยู่กึ่งกลาง ประกอบด้วย เนื้อเยื่อชั้นผิว (epidermis) 1 ชั้น มีไซฟิลล์ (mesophyll) ประกอบด้วย เซลล์ plicate และเซลล์ fusoid และมัดท่อลำเลียง (vascular bundle) พบมัดท่อลำเลียงของเส้นใบหลัก (vein) และ มัดท่อลำเลียงของเส้นใบย่อย (veinlet) (Figure 1 and 2) เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบน (upper epidermis) และเนื้อเยื่อ ชั้นผิวด้านล่าง (lower epidermis) มีความแตกต่างกัน เนื้อเยื่อชั้นผิวประกอบด้วยเซลล์ผิว (epidermal cell) เซลล์ชั้นดึ่ง ขน ปากใบ และผลึกซิลิกา




Figure 1 Illustration of Leaf bamboo anatomy features in cross section.

Notes: UE: Upper Epidermis LE: Lower Epidermis SS: Small Silica LS: Large Silica BU: Bulliform TP: Thick Papillae ST: Short Trichome (Prickle Trichome) LT: Long Trichome UPC: Upper plicate LPC: Lower plicate FU: Fusoid cell S: Stomata BSE: Bundle Sheath Extension PBS: Paranchyma Bundle Sheath MBS: Mestom Bundle Sheath MV: Metavessel PH: phloem TE: Tracheary Elements





Figure 2 Photograph of Leaf bamboo anatomy features in cross section at the middle of leaf blade..

Notes: UE: Upper Epidermis LE: Lower Epidermis SS: Small Silica BU: Bulliform TP: Thick Papillae ST: Short Trichome (Prickle Trichome) LT: Long Trichome

เซลล์ผิว

เซลล์ผิวปกติ

ทั้งสองด้านของใบไม้มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน พบว่าเซลล์ผิวด้านบนมีขนาดใหญ่และมีรูปร่างหลากหลาย ส่วนเซลล์ผิวด้านล่างเซลล์มีขนาดเล็กและแบนกว่า เซลล์ผิวปกติด้านบนมีรูปร่างเป็นรูปไข่ วงรี และรูปสี่เหลี่ยม เรียงตัวทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ในระหว่างหนึ่งช่วงของเซลล์ชั้น พบจำนวนตั้งแต่ 4-15 เซลล์ และมีขนาดความกว้างของเซลล์ตั้งแต่ 8-28 μm เซลล์ผิวปกติด้านบนพบ 2 แบบ ดังนี้ แบบที่หนึ่ง ขนาดเซลล์ผิวปกติบริเวณตรงกลางช่วงที่ตรงกับตำแหน่งมัดท่อลำเลียงมีขนาดเล็กและเพิ่มขนาดขึ้นจากตรงกลางช่วงจนถึงเซลล์ชั้นที่ขอบข้างทั้งสองด้าน (Figure 3 a)



(a)

แบบที่สอง ขนาดเซลล์ผิวปกติมีขนาดสม่ำเสมอตลอดทั้งช่วงหรือมีขนาดเซลล์ใกล้เคียงกันตลอดทั้งช่วงของเซลล์ชั้น (Figure 3 b) เซลล์ผิวปกติด้านบนส่วนใหญ่จะปรากฏการเรียงตัวทั้งสองแบบ โดยเรียงตัวสลับกันทั้งสองแบบในช่วง เซลล์ชั้น ได้แก่ ใผ่ป่า ใผ่เขียว ใผ่บงหวานเมืองเลย ใผ่บงใหญ่ และใผ่กระโรม และเซลล์ผิวด้านบนที่ปรากฏการเรียงตัวแบบที่สองเพียงลักษณะเดียวตลอดทั้งแผ่นใบ ได้แก่ ใผ่ดำผัว ใผ่มันหมู ใผ่ขางคำ และใผ่หูก เป็นต้น เซลล์ผิวด้านล่างมีรูปร่างเซลล์ส่วนใหญ่เป็นรูปครึ่งวงกลม เซลล์มีขนาดเล็กและแบนเรียงตัวในแนวนอนเป็นส่วนใหญ่ ในหนึ่งช่วงของเซลล์ชั้น พบจำนวนตั้งแต่ 7-22 เซลล์ และมีขนาดความกว้างของเซลล์ตั้งแต่ 7-21 μm และไม่ปรากฏเซลล์ชั้นที่เซลล์ผิว



(b)

Figure 3 The Arrangement features of upper normal epidermis (NE).

เซลล์ชั้น

พบเฉพาะที่เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบนและเรียงตัวขนานกับเส้นใบ เกิดจากการเรียงตัวของเซลล์ 2-4 เซลล์ ปกติเซลล์ชั้นมีขนาดเซลล์ใหญ่กว่าเซลล์ผิวปกติด้านบน แต่ในใผ่บางชนิดพบว่ามีความใกล้เคียงกับเซลล์ผิวปกติ เซลล์ชั้นมีขนาดความสูงของเซลล์ 13-90 μm และพบว่าภายในเซลล์ชั้นของใผ่บางชนิดมีการสะสมผลึกซิลิกาและปรากฏเป็นรูปร่างตามรูปร่างของเซลล์ชั้น โดยส่วนใหญ่มีรูปร่างคล้ายรูปพัด (fan-shaped silica) (Figure 5 a) มีขนาดความสูงของ

ซิลิกา 27-90 μm ยกเว้นในใผ่นวล และใผ่ขางนวล ที่ไม่พบการสะสมผลึกซิลิกา ลักษณะการเรียงตัวของเซลล์ชั้นที่แผ่นใบปรากฏที่เซลล์ผิวปรากฏ 2 แบบ ดังนี้ แบบที่หนึ่ง เซลล์ชั้นมีส่วนฐานแทรกลงไปในชั้นมีไซฟิลล์ทำให้ส่วนปลายของเซลล์ชั้นเสมอหรือต่ำกว่าเซลล์ผิวปกติ (Figure 4 a) และแบบที่สอง เซลล์ชั้นมีส่วนฐานอยู่ในระดับต่ำกว่าเซลล์ผิวปกติเล็กน้อย ส่วนปลายของเซลล์ชั้นโผล่สูงกว่าระดับของเซลล์ผิวปกติด้านบน โดยเซลล์ชั้นในแต่ละลักษณะก็มีความแปรผันไปในแต่ละชนิด (Figure 4 b)




Figure 4 Variation of bulliform features in upper epidermis, (a) : sunken bulliform feature and (b) : raised bulliform feature.

ผลึกซิลิกา

ที่ปรากฏที่เซลล์ผิว (Figure 5 b) มีรูปร่างเป็นแบบ flat towers (FT), two horned towers (THT), long saddle (LSS), short saddle (SS) และ saddle ellipsoid (SE) โดยที่เซลล์ผิวใบทั้งสองด้านปรากฏซิลิกาแบบ two horned towers กระจายทั่วไปมีขนาดเล็กกว้างตั้งแต่ 8 – 10 μm ซิลิกาแบบ saddle ellipsoid และ flat towers พบกระจายทั่วไปโดยส่วนใหญ่พบที่เซลล์ผิวด้านบน

และซิลิกาแบบ long saddle และ short saddle มีขนาดกว้างเท่ากับหรือมากกว่าขนาดของเซลล์ผิว โดยมีขนาดประมาณ 30 μm ซึ่งปรากฏติดกับเซลล์พวง (bundle sheath extension) ของมัดท่อลำเลียงทั้งด้านบนและด้านล่าง และปรากฏชัดเจนที่เซลล์ผิวด้านบนของไผ่ลั่นทม ไผ่บงดำ ไผ่รวกเขา ไผ่ซางดำ ไผ่ป่า ไผ่กระโรม ไผ่บงหวานเมืองเลย และไผ่เขียว




Figure 5 Silica features in epidermal layer, (a): Fan-shaped silica in bulliform cell and (b): Small silica in epidermal cell.

Notes: FT: flat towers shape silica THT: two horned towers shape silica LS: long saddle shape silica SS: short saddle shape silica SE: saddle ellipsoid shape silica (Lu and Liu, 2003)

ปากใบ

พบที่เซลล์ผิวทั้งสองด้าน เซลล์คุม (guard cells) มีรูปร่างคล้ายคัมเบล (dumbbell) และอยู่ระดับต่ำกว่าเซลล์ผิวเล็กน้อย โดยไผ่เขียว ไผ่บงดำ ไผ่รวกเขา และไผ่ลั่นทมไม่ปรากฏปากใบที่เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบน ส่วนไผ่ป่ามีการปรากฏปากใบที่เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบนเป็นจำนวนมาก (Figure 1)

ขน

ที่เซลล์ผิวทั้งสองด้านพบขน 2 แบบ (Figure 6 and 7) ได้แก่ ขนแบบที่หนึ่ง มีลักษณะคล้ายเซลล์พวง และขนแบบที่สอง มีลักษณะคล้ายดิ่งยื่นออกมาจากผนังเซลล์ โดยขนแบบที่หนึ่ง มีลักษณะเป็นเซลล์เดี่ยว (unicellular) ซึ่งแบ่งเป็น ขนสั้น (short trichome) หรือขนสั้นหนาม (prickle trichome) และขนยาว (long

trichome) โดยขนสั้นหรือขนสั้นหนาม มีความยาวไม่เกิน 30 μm ส่วนขนยาว มีความยาวมากกว่า 31 μm ขึ้นไป (Figure 6 a and 7 a) ขนแบบที่สอง มีลักษณะคล้ายดิ่ง (papillae) ขึ้นออกมาจากผนังเซลล์ เป็นแบบดิ่งทึบ (thick papillae trichome) เป็นดิ่งที่มีลักษณะเรียวยาวเล็ก ปลายมน ดิ่งหนา ปลายตัด และบางครั้งปรากฏปลายแตกขนาดเล็ก 2-3 แฉก ติดสีชมพูของ safranin ดี (Figure 6 b and 7 b) เซลล์ผิวหนังด้านบนโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยพบขน ซึ่งความถี่ในการพบต่อหนึ่งช่วงของเซลล์ย่นเท่ากับ 1-2 ขน ต่อหนึ่งช่วง (Figure 6 c) เป็น

ขนสั้นและขนยาว มีขนาดความยาวของขนตั้งแต่ 14-144 μm และมีไฟ 3 ชนิดที่ปรากฏ papillae ที่เซลล์ผิวหนังด้านบน ได้แก่ ไฟขาวดำ ไฟชางนวล และไฟกระโรม ซึ่งขนโดยส่วนใหญ่ปรากฏทั้งสองด้านของไฟยกรวนไฟเขียว ปรากฏเฉพาะที่เซลล์ผิวหนังด้านล่างเท่านั้น ความถี่ในการปรากฏของขนที่เซลล์ผิวหนังด้านล่างในหนึ่งช่วงของเซลล์ย่นสามารถพบขนได้ 1-6 ขน ต่อหนึ่งช่วง (Figure 7 c) เป็นขนสั้นและขนยาว มีขนาดความยาวของขนตั้งแต่ 12 -1,116 μm และพบดิ่งทึบที่เซลล์ผิวหนังด้านล่างในไฟทุกชนิด




Figure 6 Trichome features in upper epidermis, (a): short trichome and long trichome (b): cell wall extended-like trichome with thick papillae and (c): Number of trichomes in one bulliform's range.




Figure 7 Trichome features in lower epidermis, (a): short trichome and long trichome, (b): cell wall extended-like trichome with thick papillae and (c): Number of trichomes in one bulliform's range.

จากลักษณะเนื้อเยื่อชั้นผิวของใบไม้ที่แสดงรูปแบบการเรียงตัวของเซลล์ผิว การเรียงตัวของเซลล์ขนที่เซลล์ผิว การปรากฏของซิลิการูปพัดในเซลล์ขน ความถี่ในการปรากฏและลักษณะต่างๆ ของขน การปรากฏและลักษณะต่างๆ ของขนแบบดิ่งทึบ (thick

papillae trichome) และความถี่ในการปรากฏผลึกซิลิกาที่เซลล์ผิว โดยลักษณะข้างต้นเหล่านี้สามารถนำมาจัดกลุ่มตามรูปร่างของใบชนิดต่างๆ ในสกุล *Bambusa*, *Gigantochloa* และ *Dendrocalamus* โดยใช้ลักษณะเซลล์ผิว

ใบที่พบขน ที่เซลล์ผิวเพียงหนึ่งด้าน ใบเขียว (*B. vulgaris*)

ใบที่พบขน ที่เซลล์ผิวทั้งสองด้าน

เซลล์ผิวปกติด้านบนเรียงตัวทั้งสองลักษณะ

พบเซลล์ขนเรียงตัวสองลักษณะ คือ มีส่วนยอดต่ำกว่าเซลล์ผิว และส่วนยอดโผล่เหนือเซลล์ผิว

ด้านบนและพบซิลิการูปพัดในเซลล์ขน

พบดิ่งทึบ (thick papillae trichome) ปรากฏที่เซลล์ผิวทั้งสองด้าน ใบกระโรม (*D. khoonmengii*)

พบดิ่งทึบ (thick papillae trichome) ปรากฏที่เซลล์ผิวเพียงด้านเดียว

ขน (trichome) ที่เซลล์ผิวด้านล่างมีความถี่ในการปรากฏที่เซลล์ผิวมากกว่าร้อยละ 70

..... ใบบงใหญ่ (*D. brandisii*)

ขน (trichome) ที่เซลล์ผิวด้านล่างมีความถี่ในการปรากฏที่เซลล์ผิวน้อยกว่าร้อยละ 30

..... ใบบงหวานเมืองเลย (*B. burmanica*)

พบเซลล์ขนเรียงตัวในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั้น และพบซิลิการูปพัดในเซลล์ขน

..... ใบป่า (*B. bambos*)

เซลล์ผิวปกติด้านบนเรียงตัวแบบลักษณะที่สองเพียงลักษณะเดียว

พบเซลล์ขนเดี่ยวเรียงตัวสองลักษณะ

ไม่พบซิลิการูปพัดภายในเซลล์ขน.....ไผ่ขางนวล (*D. membranaceus*)

พบซิลิการูปพัดภายในเซลล์ขน

พบขนที่เซลล์ผิวด้านบนมีความถี่ในการปรากฏน้อยกว่าร้อยละ 50¹

ขนที่เซลล์ผิวด้านล่างมีความถี่ในการปรากฏน้อยกว่าร้อยละ 50²

.....ไผ่ขางดำ (*B. tulda*)

ขนที่เซลล์ผิวด้านล่างมีความถี่ในการปรากฏมากกว่าร้อยละ 60³

พบดิ่งทึบ ที่เซลล์ผิวด้านบนไผ่ขางดำ (*D. strictus*)

ไม่พบดิ่งทึบ ที่เซลล์ผิวด้านบน

เซลล์ผิวด้านบนพบผลึกซิลิกาปรากฏในทุกช่วงของเซลล์ขน

.....ไผ่ลั่นทม (*B. longispiculata*)

เซลล์ผิวด้านบนพบผลึกซิลิกาปรากฏกระจายไม่ทุกช่วงของเซลล์ขน

.....ไผ่ด้ามพริ้ว (*G. ligulata*)

พบขนที่เซลล์ผิวด้านบนมีความถี่ในการปรากฏมากกว่าร้อยละ 50³

ขนที่เซลล์ผิวด้านล่างมีความถี่ในการปรากฏน้อยกว่าร้อยละ 50¹

.....ไผ่ไร่ (*G. albociliata*)

ขนที่เซลล์ผิวด้านล่างมีความถี่ในการปรากฏมากกว่าร้อยละ 90³

.....ไผ่หก (*D. hamiltonii*)

พบเซลล์ขนเดี่ยวเรียงตัวลักษณะเดียว พบและไม่พบซิลิการูปพัด

พบซิลิการูปพัดใน เซลล์ขน

ขนที่เซลล์ผิวด้านบนมีความถี่ในการปรากฏน้อยกว่าร้อยละ 50¹

.....ไผ่มันหมู (*D. copelandii*)

ขนที่เซลล์ผิวด้านบนมีความถี่ในการปรากฏมากกว่าร้อยละ 90³

.....ไผ่รวกเขา (*D. dumosus*)

ไม่พบซิลิการูปพัดใน เซลล์ขน.....ไผ่โน้ม (*D. pendulus*)

การปรากฏของขน (trichome) โดยเทียบ 10 ช่วง เซลล์ขน เท้ากับร้อยละ 100 หรือเท่ากับ 1 แผ่นใบ

¹ ความถี่ในการปรากฏน้อยกว่าร้อยละ 50 หมายความว่า มีการปรากฏของเซลล์โดยมีจำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งโดยนับ 10 ช่วง เซลล์ขน

² ความถี่ในการปรากฏระหว่างร้อยละ 50 – 80 หมายความว่า มีการปรากฏของเซลล์โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งแต่ไม่ปรากฏทุกช่วง โดยนับ 10 ช่วง เซลล์ขน

³ ความถี่ในการปรากฏมากกว่าร้อยละ 90 หมายความว่า มีการปรากฏของเซลล์โดยปรากฏ 10 ช่วง เซลล์ขน

หมายเหตุ: ร้อยละที่พบแต่ละลักษณะ

ร้อยละ 0 – 20 หมายความว่าพบเป็นจำนวนน้อยมากที่เซลล์ผิว

ร้อยละ 21 – 40 หมายความว่าพบเป็นจำนวนน้อยที่เซลล์ผิว

ร้อยละ 41 – 60 หมายความว่าพบเป็นจำนวนปานกลางที่เซลล์ผิว

ร้อยละ 61 – 80 หมายความว่าพบเป็นจำนวนมากที่เซลล์ผิว

ร้อยละ 81 – 100 หมายความว่าพบทุกช่วงที่เซลล์ผิว

สรุป

ลักษณะเนื้อเยื่อชั้นผิวของใบไผ่สามารถนำมาใช้ในการจำแนกสกุลและชนิดของไผ่ได้ โดยใช้ลักษณะดังต่อไปนี้รูปแบบการเรียงตัวของเซลล์ผิวชั้นบน การเรียงตัวของเซลล์ชั้นที่เซลล์ผิว การปรากฏของซิลิกา รูปพัดในเซลล์ชั้น คความถี่ในการปรากฏและลักษณะต่างๆ ของขน การปรากฏและลักษณะต่างๆของดงทึบ และความถี่ในการปรากฏของผลึกซิลิกาที่เซลล์ผิว ส่วนลักษณะของปากใบไม่สามารถนำมาใช้ในการจัดจำแนกได้พบว่า ไผ่ที่เซลล์ผิวปกติเรียงตัวทั้งสองรูปแบบ ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่เขียว ไผ่บงหวานเมืองเลย ไผ่บงใหญ่ และไผ่กระโรม ไผ่ที่เซลล์ผิวปกติเรียงตัวในแบบเลี้ยวตลอดทั้งแผ่นใบ ได้แก่ ไผ่ด้ามพร้า ไผ่ไร่ ไผ่ล้ามะลอก ไผ่บงดำ ไผ่บงดำ ไผ่รวกเขา ไผ่มันหมู ไผ่ชางดำ ไผ่ชางนวล และไผ่หก เซลล์ชั้นดงทึบเฉพาะที่เซลล์ผิวด้านบนและเรียงตัวขนานกับเส้นใบ มีการเรียงตัวของเซลล์ผิวสองแบบดังนี้ เซลล์ชั้นดงทึบมีส่วนยอดต่ำกว่าเซลล์ผิว และเซลล์ชั้นดงทึบมีส่วนยอดโผล่เหนือเซลล์ผิวด้านบน ซึ่งพบว่าเป็นไผ่รวกเขา มีการกระจายของเซลล์ชั้นดงทึบที่มีส่วนยอดต่ำกว่าเซลล์ผิวเป็นจำนวนมาก ไผ่บงดำ และไผ่ชางนวล ไม่ปรากฏซิลิกา รูปพัดในเซลล์ชั้น ส่วนไผ่บงหวานเมืองเลยปรากฏซิลิการูปพัดภายในเซลล์ชั้นดงทึบตลอดทั้งแผ่นใบ การปรากฏของขน พบว่า ไผ่เขียวปรากฏเพียงหนึ่งด้าน และมีไผ่ 3 ชนิดที่ปรากฏขนแบบดงทึบ ที่เซลล์ผิวด้านบน ได้แก่ ไผ่ชางดำ ไผ่ชางนวล และไผ่กระโรม ขนที่เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบนมีความถี่ในการปรากฏเป็นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ไผ่ด้ามพร้า ไผ่ล้ามะลอก ไผ่บงดำ ไผ่ป่า ไผ่บงหวานเมืองเลย ไผ่มันหมู ไผ่ชางดำ ไผ่ชางนวล และไผ่บงใหญ่ และขนที่เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบนที่มีความถี่ในการปรากฏเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่บงดำ ไผ่รวกเขา ไผ่หก ซึ่งไผ่กระโรม และไผ่รวกเขา ปรากฏขน จำนวน 2 ขน ในหนึ่งช่วงของเซลล์ชั้นดงทึบตลอดทั้งแผ่นใบ และไผ่ไร่กับไผ่กระโรม ปรากฏ ขนจำนวน 5 ขน ในหนึ่งช่วงของเซลล์ชั้นดงทึบ แต่ปรากฏเป็นบางช่วงเท่านั้น เซลล์ผิวด้านล่างมีความถี่ในการปรากฏของขนเป็นจำนวนน้อยกว่า

ร้อยละ 50 ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่บงดำ ไผ่ป่า ไผ่เขียว ไผ่บงหวานเมืองเลย และไผ่บงดำ ซึ่งไผ่ไร่ปรากฏขนจำนวน 2 ขน ในหนึ่งช่วงของเซลล์ชั้นดงทึบตลอดทั้งแผ่นใบ และขนที่เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านล่างมีความถี่ในการปรากฏเป็นจำนวนมากกว่าร้อยละ 70 ได้แก่ ไผ่ด้ามพร้า ไผ่ล้ามะลอก ไผ่รวกเขา ไผ่มันหมู ไผ่ชางดำ ไผ่หก และ ไผ่บงใหญ่ และไผ่ที่มีความถี่ในการปรากฏของขนตลอดทั้งแผ่นใบ ได้แก่ ไผ่รวกเขา ไผ่มันหมู และ ไผ่หก ซึ่งไผ่มันหมู และไผ่หก ปรากฏขนจำนวน 6 ขน ในหนึ่งช่วงของเซลล์ชั้นดงทึบ แต่พบเพียงบางช่วงของเซลล์ชั้นดงทึบเท่านั้น ไผ่ที่ไม่ปรากฏปากใบที่เนื้อเยื่อชั้นผิวด้านบน ได้แก่ ไผ่เขียว ไผ่บงดำ ไผ่รวกเขา และไผ่มันหมู

REFERENCES

- Chin-Ying Wu M. 1962. The classification of Bambuseae based on leaf anatomy. **Botanical bulletin of Academia Sinica** 3: 83-108
- Esau, K. 1977. **Anatomy of Seed Plants**. 2nd ed. John Wiley & Sons New York England.
- Lu, H. and K.B. Liu. 2003. Phytoliths of common grass in the coastal environment of southeastern USA. **Estuarine Coastal and Shelf Science** 58: 587-600
- Metcalf, C. R. 1960. **Anatomy of the Monocotyledons I. Gramineae**. Oxford University Press USA
- Milan, P., A.H. Hayashi and B. Appezzato-da-Glória. 2006. Comparative leaf morphology and anatomy of three Asteraceae species. **Braz. arch. biol. technol.** 49 (1): 135-144
- Paliwal, D.P., A.K. Pliwal and C.J. Parbhkar. 2012. Leaf Morphological and Epidermal Features as an Aid to The

- Taxonomy of Different Mophotypes of Muga Silkworm Host Plant *Litsaea monopetala* PERS.. **Indian J.L.Sci.** 2 (1): 67-72.
- Pandy, S.N. and A. Chadha. 1994. **A Textbook of Botany (Plant Anatomy and Economic Botany)**. 2 ed. Vikas Publishing House PVT Ltd. New Delhi India
- Piperno, D.R. 2006. **Phytoliths: A Comprehensive Guide for Archaeologists and Paleoecologists**. AltaMira Press USA
- Reis, C., M. Graças Sajo and J.R. Stehmann. 2002. Leaf Structure and Taxonomy of *Petunia* and *Calibrachoa* (Solanaceae). **Braz. arch. biol. technol.** 45 (1) : 59-66
- Saheed, S.A. and H.C. Illoh. 2010. A taxonomic study of some species in *Cassiinae* (LEGUMINOSAE) in south western nigeria using Leaf epidermal characters. **Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj** 38 (1): 21-27.
- Silva J.M., R.H.P. Andreato and B.A. Glória. 2012. Aerial organ anatomy of *Smilax siphilitica* (Smilacaceae). **Rev. biol. trop** 60 (3) : 1137-1148
- Siripatanadilok S. 1983. **Microtechnique**. Department of Forest Biology Faculty of Forestry Kasetsart University (in Thai)
- Soontornchainaksaeng P. 2006. **Anatomy and Morphology of Flowering Plants** Top. Bangkok. P. 400 (in Thai)
- Yasmin G., M.A. Khan, N. Shaheen and M.Q. Hayat. 2010. Taxonomic Significant of Leaf Epidermal Anatomy of Selected *Persicaria* Mill. Species of Family Polygonaceae from Pakistan. **African Journal Biotechnology** 9 (25): 3759-3768.
-