

## การศึกษาคุณสมบัติการต้านจุลชีพของโปรตีนลูกลผสม Shrimp Ovarian Peritrophin domain A (SOP-A) จาก *Fenneropenaeus merguensis*

### Antimicrobial Activity of Shrimp Ovarian Peritrophin Domain A (SOP-A) Recombinant Protein from *Fenneropenaeus Merguensis*

สุจรรยา อนุชาญ<sup>1,2\*</sup>, เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร<sup>3</sup> และ วิลาวรรณ โชติเกียรติ<sup>1,2</sup>

Sujunya Anuchan<sup>1,2\*</sup>, Saowaluk Phongpajit<sup>3</sup> and Wilaiwan Chotigeat<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ; <sup>2</sup>ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ; <sup>3</sup>ภาควิชาจุลชีววิทยา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 90112

<sup>1</sup>Center for Genomics and Bioinformatics Research; <sup>2</sup>Department of Molecular Biotechnology and Bioinformatics; <sup>3</sup>Department of Microbiology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hatyai, Songkhla, 90112

\*Corresponding author: sujunya\_ma@yahoo.com

#### บทคัดย่อ

ในงานวิจัยชิ้นนี้เราได้ผลิตและทำการศึกษาคูณสมบัติการต้านจุลชีพของโปรตีนลูกลผสม Shrimp Ovarian Peritrophin domain A (SOP-A) พบว่าโปรตีนที่ผลิตได้มีขนาดโมเลกุลประมาณ 9 kDa และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Vibrio harveyi*, *Candida albicans* และ *Fusarium oxysporum* โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.035 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.57mg/ml และ 0.015 mg/ml ตามลำดับและค่า MBC/MFC เท่ากับ 0.035 mg/ml, 0.57 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.57 mg/ml และ 0.015 mg/ml ตามลำดับ

#### ABSTRACT

In this study, we have produced and performed antimicrobial assay of Shrimp Ovarian Peritrophin domain A (SOP-A) protein. The result showed that the molecular weight of purified SOP-A protein is about 9 kDa. Purify SOP-A protein inhibited the growth of *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Vibrio harveyi*, *Candida albicans* and *Fusarium oxysporum* with minimal inhibitory concentrations of 0.035 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.57 mg/ml and 0.015 mg/ml respectively. Minimal Bactericidal/Fungicidal Concentration of SOP-A with *S. aureus*, *E. coli*, *V. harveyi*, *C. albicans* and *F. oxysporum* were 0.035 mg/ml, 0.57 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.57 mg/ml and 0.015 mg/ml, respectively.

**คำสำคัญ:** SOP-A, การต้านจุลชีพ, *Fenneropenaeus merguensis*

**Keyword:** SOP-A, antimicrobial, *Fenneropenaeus merguensis*

**บทนำ**

Antimicrobial peptide (AMPs) เป็นสารประกอบที่สำคัญของระบบ innate immune เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเรียและเชื้อราสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดโดย AMPs ที่ค้นพบส่วนใหญ่เป็น cysteine-rich antimicrobial peptide ซึ่งจะพบมากในพวก arthropods และ invertebrates (Dimarcq *et al.*, 1998) เนื่องจากกุ้งไม่มีระบบภูมิคุ้มกันแบบ adaptive จะมีเฉพาะ innate cellular และ humoral immune response (Bachere *et al.*, 2004) จึงมีการสร้าง antimicrobial peptide เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันการบุกรุกของ pathogen ต่างๆ ตัวอย่างของ AMPs ที่มีการศึกษาใน Penaeid shrimps ได้แก่ Anti-lipopolysaccharide factor (ALFs), Crustins, Penaeidins และ Stylicins (Antony *et al.*, 2011) จากการศึกษาการแสดงออกของยีนเพื่อดูการทำงานของโปรตีนในกุ้งแช่บ๊วย *Fenneropenaeus merguensis* พบว่ามียีนที่น่าสนใจคือ Shrimp ovarian peritrophin (*Fm-SOP*) ซึ่งเป็นโปรตีนหลักใน jelly layer (JL) และ cortical rods (CRs) มีบทบาทสำคัญในการป้องกันอันตรายของไข่กุ้งจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทันทีหลังจากที่กุ้งมีการวางไข่ยีน *Fm-SOP* ประกอบด้วย cysteine-rich domains อยู่หลายตำแหน่งซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งที่พบใน AMPs หลายชนิดและจากการศึกษาคุณสมบัติการต้านจุลชีพของโปรตีน *Fm-SOP* พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ *V. harveyi* และ *S. aureus* มีค่า MIC เท่ากับ 0.11 mg/ml และ 0.86 mg/ml ตามลำดับ (Loongyai *et al.*, 2007) นอกจากนี้กรดอะมิโนตำแหน่งที่ 80-81 ของยีน *Fm-SOP* สามารถถูกตัดด้วยเอนไซม์ furin (subtilisin-like endoprotease) ทำให้เกิดเป็น 2 domain คือ domain A เริ่มตั้งแต่กรดอะมิโนตำแหน่งที่ 1-80 และ domain B ตั้งแต่ตำแหน่งที่ 81-329 ซึ่งทั้ง 2 domain จะมีส่วนที่เป็น cysteine-rich domains อยู่และได้มีการศึกษาคุณสมบัติการต้านจุลชีพในส่วนของ domain B พบว่ามีคุณสมบัติในการยับยั้ง *V. harveyi*, *S. aureus* และ *F. oxysporum* มีค่า MIC เท่ากับ 0.27 mg/ml, 0.03 mg/ml และ 0.5 mg/ml ตามลำดับ (นริวัตร, 2555) ในงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาคุณสมบัติการต้านจุลชีพของโปรตีน *Fm-SOP* ในส่วนของ domain A เพื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพกับ Full length และ domain B เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นสาร antibiotics ต่อไป

**อุปกรณ์และวิธีการ**

**1. การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีน SOP-A ในแบคทีเรีย *E. coli* สายพันธุ์ BL 21**

นำพลาสมิดดีเอ็นเอลูกผสม pGEX-SOP-A ในแบคทีเรีย *E. coli* สายพันธุ์ BL 21 เลี้ยงในอาหารเหลว 2xYT ที่มี Ampicillin ความเข้มข้น 100 µg/ml จนได้ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 nm ให้มีค่าประมาณ 0.4-0.6 จึงกระตุ้นแบคทีเรียให้เกิดการสร้างโปรตีนด้วยสารละลาย 1 mM IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชม. แยกเก็บเซลล์แบคทีเรียโดยการนำไปหมუნเหวี่ยงแล้วละลายด้วย buffer A (50mM Tris-HCl, 5 mM EDTA, pH 7.5) จากนั้นทำให้เซลล์แตกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (sonication) จากนั้นนำไปหมუნเหวี่ยงแล้วเก็บส่วนที่เป็นตะกอน (inclusion body) นำมาล้างด้วย washing buffer (50 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8.0, 1% Triton x-100) จนตะกอนเปลี่ยนเป็นสีขาว ละลายตะกอนด้วย buffer D (50 mM Tris-HCl, 5 mM EDTA, pH 8.0, 5 M Guanidine HCl) จากนั้นตัด GST-tagged ออกด้วย thrombin (GE Healthcare, Thailand) ตรวจสอบโปรตีนที่ผลิตได้ด้วย 12% sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE)


**2. การศึกษาคุณสมบัติการต้านจุลชีพของโปรตีน SOP-A**

เชื้อที่ใช้ในการทดสอบประกอบด้วยแบคทีเรียแกรมบวก *S. aureus* (ATCC 25923), *Micrococcus luteus*, *Bacillus megaterium*, *Enterococcus faecalis*, แบคทีเรียแกรมลบ *V. harveyi*, *E. coli* (ATCC25922), *Enterobacter cloaca*, *Salmonella typhimurium*, *Pseudomonas aeruginosa* ยีสต์ *C. albicans* และเชื้อรา *F. oxysporum* ใช้วิธี liquid growth inhibition assays (Bond *et al.* 2002; Loongyai *et al.* 2007) โดยนำโปรตีนบริสุทธิ์ SOP-A 10 ไมโครลิตรที่ความเข้มข้นต่างๆแบบ serial dilution มาบ่มกับ 90 ไมโครลิตรของแบคทีเรียที่ความเข้มข้น  $2.5 \times 10^5$  CFU/ml หรือ เชื้อราที่ความเข้มข้น  $8 \times 10^3$  spores/ml บ่มใน 96 well plate บ่มที่ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16-18 ชม. วัดค่าการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 630 nm ด้วยเครื่อง microplate reader จากนั้นนำหลุมที่ไม่มี การเจริญเติบโตไปเปลี่ยนบนอาหารแข็งเพื่อหาค่า MBC/MFC

**ผลการทดลองและวิจารณ์**

**1. การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีน SOP-A ในแบคทีเรีย *E. coli* สายพันธุ์ BL 21**

เมื่อกระตุ้นการสร้างโปรตีนลูกผสม GST-SOP-A ด้วย 1 mM IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyronside) ในแบคทีเรีย *E. coli* สายพันธุ์ BL 21 และทำบริสุทธิ์โปรตีน GST-SOP-A พบว่าโปรตีน GST-SOP-A มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 39 kDa และเมื่อตัด GST ออกด้วย Thrombin พบว่าได้โปรตีน SOP-A มีขนาดประมาณ 9 kDa ดังรูปที่ 1



**รูปที่ 1** แสดงผลการวิเคราะห์การแสดงผลของโปรตีน GST-SOP-A ในแบคทีเรีย *E. coli* สายพันธุ์ BL21 และการทำบริสุทธิ์โปรตีนด้วย 12% SDS-PAGE แถว M: Low molecular weight standard marker, แถว1: non induce soluble protein, แถว 2: induce soluble protein, แถว3: non induce insoluble protein, แถว 4: induce insoluble protein, แถว5: โปรตีน GST-SOP-A บริสุทธิ์, แถว6: โปรตีน SOP-A บริสุทธิ์

**2. การทดสอบฤทธิ์ต้านจุลชีพของโปรตีน SOP-A**

จากการทดสอบ antimicrobial activity ของโปรตีนบริสุทธิ์ SOP-A ด้วยวิธี MIC และ MBC ในช่วง 0.002 – 0.57 mg/ml พบว่าสามารถยับยั้งเชื้อ *E. coli*, *V. harveyi*, *S. aureus*, *C. albicans* และ *F. oxysporum* ส่วนเชื้ออื่นที่เหลือไม่สามารถยับยั้งได้ (ตาราง 1)

**ตารางที่ 1** แสดงค่า Minimal Inhibitory Concentration (MIC) และ Minimal Bactericidal Concentration (MBC) ของโปรตีน SOP-A

เชื้อที่ทดสอบ	ค่า MIC (mg/ml)	ค่า MBC (mg/ml)
<b>Gram-negative bacteria</b>		
<i>Enterobacter cloacae</i>	-	-
<i>Escherichia coli</i>	0.28	0.57
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	-
<i>Salmonella typhimurium</i>	-	-
<i>Vibrio harveyi</i>	0.28	0.28
<b>Gram-positive bacteria</b>		
<i>Bacillus megaterium</i>	-	-
<i>Enterococcus faecalis</i>	-	-
<i>Micrococcus luteus</i>	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	0.035	0.035
<b>Yeast</b>		
<i>Candida albicans</i>	0.57	0.57
<b>Fungi</b>		
<i>Fusarium oxysporum</i>	0.015	0.015

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าโปรตีน SOP-A ที่ผลิตได้นั้นมีคุณสมบัติในการเป็น antimicrobial peptide เช่นเดียวกับส่วน Full length (*Fm-SOP*) และ domain B (*SOP-B*) โดยมีความสามารถยับยั้งเชื้อ *V. harveyi* มีค่า MIC เท่ากับ 0.28 mg/ml เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับโปรตีน *Fm-SOP* มีค่า MIC เท่ากับ 0.11 mg/ml และโปรตีน *SOP-B* มีค่า MIC เท่ากับ 0.27 mg/ml พบว่าโปรตีน *SOP-A* มีฤทธิ์น้อยกว่าโปรตีน *Fm-SOP* และ *SOP-B* ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ *S. aureus* มีค่า MIC เท่ากับ 0.035 mg/ml เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่า MIC ของโปรตีน *Fm-SOP* และ *SOP-B* ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.86 mg/ml และ 0.03 mg/ml พบว่าโปรตีน *SOP-A* มีความสามารถในการยับยั้ง *S. aureus* ได้ดีกว่าโปรตีน *Fm-SOP* ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ *F. oxysporum* มีค่า MIC เท่ากับ 0.015 mg/ml เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีน *Fm-SOP* ซึ่งมีค่า MIC มากกว่า 1 mg/ml และ *SOP-B* ซึ่งมีค่า MIC เท่ากับ 0.5 mg/ml พบว่าโปรตีน *SOP-A* มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อ *F. oxysporum* ได้ดีกว่าโปรตีน *Fm-SOP* และ *SOP-B* นอกจากนี้โปรตีน *SOP-A* ยังสามารถยับยั้งเชื้อ *E.coli* และ *C. albicans* ซึ่งส่วนโปรตีน *Fm-SOP* และ *SOP-B* ไม่สามารถยับยั้งได้

### สรุปผลการทดลอง

โปรตีนบริสุทธิ์ *SOP-A* ที่ผลิตได้มีขนาดโมเลกุลประมาณ 9 KDa และสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ *S. aureus*, *E. coli*, *V. harveyi*, *C. albicans* และ *F. oxysporum* โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.035 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.57 mg/ml และ 0.015 mg/ml ตามลำดับ และค่า MBC เท่ากับ 0.035 mg/ml, 0.57 mg/ml, 0.28 mg/ml, 0.57 mg/ml และ 0.015 mg/ml ตามลำดับ

### เอกสารอ้างอิง

- นริรัตน์ เสียมใหม่. คุณสมบัติการต้านจุลชีพของ Shrimp Ovarian Peritrophin Domain B (*SOP-B*). วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา. 2555
- Antony, S.P., Singh, I.S.B., Jose, R.M., Kumar, P.R.A. and Philip, R. Antimicrobial peptide gene expression in tiger shrimp, *Penaeus monodon* in response to gram-positive bacterial probionts and white spot virus challenge. *Aquaculture*.2011;316:6-12.
- Bachere, E., Gueguen, Y., Gonzalez, M., de Lorgeril, J., Garnier, J. and Romestand, B. Insights into the anti-microbial defense of marine invertebrates: the penaeid shrimps and the oyster *Crassostrea gigas*. *Immun. Rev.*2004; 198:149–168.
- Blond, A., Cheminant, M., Garzon, D.D., Milazzo, I.S., Peduzzi, J., Goulard, C. and Rrbuffat, S. Thermolysin-linearized microcin J25 retains the structured core of the native macrocyclic peptide and displays antimicrobial activity. *J. Biochem.*2002;269:6212-6222.
- Dimarq, J.-L., Bulet, P., Hetru, C., Hoffmann, J. Cycteine-rich antimicrobial peptides in invertebrates. *Biopolymers*.1998;47: 465-477.
- Loongyai, W., Avarre, J.C., Martine, C., Lubzens, E., Chotigeat, W. Isolation and functional characterization of a new shrimp ovarian peritrophin (*SOP*) from the ovary of *Fenneropenaeus merguensis*. *Mar Biotechnol.*2007;9:624–637.